

レジメン名	FOLFIRI+Rmab			
薬品名 一般名 対象疾患	サイラムザ+イリノテカン+レボホリナート+フルオロウラシル			
	ラムシルマブ+イリノテカン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル			
	切除不能結腸・直腸がん			

作成日
最終更新日

2021.1.25
2021.1.25

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
サイラムザ	Rmab	8mg/kg	★											
イリノテカン	CPT-11	150mg/m ²	★											
レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	★											
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	★											
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	46時間											

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
ポラミン注5mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp3	初回は60minでdiv、2回目以降は30minでdiv可			
混注指示必須				
●サイラムザ点滴静注用500mg	50mL		mg	
●サイラムザ点滴静注用100mg	10mL		mg	
	8mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
全量250mLになるように生理食塩液で希釈				
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
infusion reactionの発現がなければ、3サイクル目以降は10分で投与可				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5(Rp.6の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m ²			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	
Rp.6				90minでdiv
イリノテカン点滴静注液100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注液40mg	2mL		mg	
	150mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
レボホリナートと同時に投与開始				
Rp.7				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
イリノテカン終了後				
Rp.8				全開でdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
レボホリナート終了後				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.9				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

2日目

Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
フルオロウラシル終了後				