

レジメン名	FOLFOXIRI			
薬品名	イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル			
一般名	イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル			
対象疾患	切除不能結腸・直腸がん			

作成日
最終更新日

2021.1.25
2021.1.25

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
イリノテカン	CPT-11	165mg/m ²	★													
オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	★													
レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	★													
フルオロウラシル	5-FU	3200mg/m ²	48時間													

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
プロイメンド点滴静注用150mg		1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				30minでdiv
アロキシン静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.4				60minでdiv
混注指示必須				
イリノテカン点滴静注100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注40mg	2mL		mg	
	165mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5(Rp.6の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.6				120minでdiv
オキサリプラチン点滴静注100mg	20mL		mg	
オキサリプラチン点滴静注50mg	10mL		mg	
	85mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
レボホリナートと同時に投与開始				
Rp.7				48hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	3200mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
レボホリナート終了後				

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
フルオロウラシル終了後				