

レジメン名	FOLFOXIRI+Bmab		
薬品名 一般名 対象疾患	ペバシズマブBS+イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル		
	ペバシズマブ+イリノテカン+オキサリプラチン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル		
	切除不能結腸・直腸がん		

作成日
最終更新日

2021.1.25
2021.1.25

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ペバシズマブBS	Bmab	5mg/kg	★													
イリノテカン	CPT-11	165mg/m ²	★													
オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	★													
レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	★													
フルオロウラシル	5-FU	3200mg/m ²	48時間													

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2	初回は90minでdiv、2回目60minでdiv 3回目以降は30minでdiv可			
混注指示必須				
ペバシズマブBS点滴静注400mg	16mL		mg	
ペバシズマブBS点滴静注100mg	4mL		mg	
	5mg/kg			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				30minでdiv
ブロイメンド点滴静注用150mg		1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day4にデキサメタゾン8mgを内服				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				60minでdiv
イリノテカン点滴静注100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注40mg	2mL		mg	
	165mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.6(Rp.7の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.7				120minでdiv
オキサリプラチン点滴静注100mg	20mL		mg	
オキサリプラチン点滴静注50mg	10mL		mg	
	85mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
レボホリナートと同時に投与開始				
Rp.8				48hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	3200mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
レボホリナート終了後				

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
フルオロウラシル終了後				