

レジメン名	<b>SOX+Bmab</b>
薬品名	<b>ペバシズマブBS+オキサリプラチン+エスワソタイホウ</b>
一般名	ペバシズマブ+テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム配合剤+オキサリプラチン
対象疾患	切除不能結腸・直腸癌

作成日  
最終更新日

2021.1.25  
2021.1.25

	day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	投与スケジュール		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休
オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	★																				
エスワソタイホウ	S-1	80~120mg/日	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
ペバシズマブBS	Bmab	7.5mg/kg	★																				
エスワソタイホウはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.0mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
day2,day3にデキサメタゾン8mgを内服				
エスワソタイホウ: day1夕食後~day15朝食後				
Rp.3				初回は90minでdiv、2回目60minでdiv 3回目以降は30minでdiv可
<b>混注指示必須</b>				
ペバシズマブBS点滴静注400mg	16mL		mg	
ペバシズマブBS点滴静注100mg	4mL		mg	
			7.5mg/kg	
生理食塩液100mL		1	B	
Rp.4				120minでdiv
オキサリプラチン点滴静注100mg	20mL		mg	
オキサリプラチン点滴静注50mg	10mL		mg	
			130mg/m <sup>2</sup>	
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間