

レジメンNo	血液NHL37	システム登録No	12037
レジメン名	[DLBCL]BR(2-6コース目)	診療科	血液内科
薬品名	トレアキシシ+リツキシマブBS		
一般名	ベンダムスチン+リツキシマブ		
対象疾患	びまん性大細胞型B細胞リンパ腫		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2022.9.1
2022.9.1

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
トレアキシシ		★	★																		
リツキシマブBS	R																				

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day3、day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.3				10minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
*トレアキシシ点滴静注液100mg	4mL		mg	
	120mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★リツキシマブBS投与30分前にカロナール500mgを服用				
Rp.5				IV(側管)
ポララミン注5mg	1mL	1	A	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day3、day4にデキサメタゾン8mgを内服				
Rp.3				10minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
*トレアキシシ点滴静注液100mg	4mL		mg	
	120mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				30minでdiv
ソル・コーテフ注射用100mg		1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.7	100mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に100mL/hずつ上げて、最大400mL/hまで(前回投与時に問題がなかった場合)			
リツキシマブBS点滴静注500mg	50mL		mg	
リツキシマブBS点滴静注100mg	10mL		mg	
	375mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
リツキシマブの投与量(mL)×9倍の生理食塩液で希釈(1mg/mL)				
Rp.8				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	