

レジメンNo	血液NHL44	システム登録No	12044
レジメン名	<b>Pola+R-CHP(1コース目)</b>	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	<b>ポライビー+リツキシマブBS+エンドキサン+ドキシソルビシン+プレドニン</b> ポラツズマブベドチン+リツキシマブ+シクロホスファミド+ドキシソルビシン+プレドニゾロン びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2022.9.8  
2022.9.8

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
リツキシマブBS	R	375mg/m <sup>2</sup>	★																				
ポライビー	Pola	1.8mg/kg	★																				
エンドキサン	CPA	750mg/m <sup>2</sup>	★																				
ドキシソルビシン	DXR	50mg/m <sup>2</sup>	★																				
プレドニン	PSL	100mg/body	★	★	★	★	★																

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★リツキシマブ投与30分前にカロナール500mgを服用				
Rp.2				IV(側管)
パラミン注5mg	1mL	1	A	
Rp.3				15minでdiv
ソル・コーテフ注射用100mg		1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.5	50mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に50mL/hずつ上げて、最大400mL/hまで			
混注指示必須				
リツキシマブBS点滴静注500mg	50mL		mg	
リツキシマブBS点滴静注100mg	10mL		mg	
	375mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
リツキシマブの投与量(mL)×9倍の生理食塩液で希釈(1mg/mL)				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★アプレピタントカプセルの処方を確認してください				
Rp.7				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.8				90minでdiv
●ポライビー点滴静注用140mg			mg	
●ポライビー点滴静注用30mg			mg	
	1.8mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
30mg:1.8mL/V、140mg:7.2mL/Vの注射用水で溶解(20mg/mL)				
5%ブドウ糖液100mL	100mL		mL	
全量75mLとなるように5%ブドウ糖液で希釈 (体重30kg~112.5kgで希釈後濃度が0.72mg/mL~2.70mg/mL)				
Rp.9				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.10				120minでdiv
CSTDを使用				
注射用エンドキサン500mg			mg	
注射用エンドキサン100mg			mg	
	750mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
Rp.11				30minでdiv
*ドキシソルビン塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	
*ドキシソルビン塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
	50mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.12				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	