| レジメンNo | 血液NHL51 | システム登録No | 12051 |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | G-CHOP(2-6コース目) | 診療科 | 血液内科 |
| 薬品名 | ガザイバ+エンドキサン+ドキソルビシン+オンコビン+プレドニン | | |
| 一般名 | オビヌツズマブ+シクロホスファミド+ドキソルビシン+ビンクリスチン+プレドニゾロン | | |
| 対象疾患 | 濾胞性リンパ腫 | | |


作成日 2023.2.1
最終更新日 2023.2.1

| day | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投与スケジュール | | | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ガザイバ | | 1000mg/body | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| エンドキサン | CPA | 750mg/㎡ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドキソルビシン | DXR | 50mg/㎡ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコビン | VCR | 1.4mg/㎡ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニン | PSL | 100mg/body | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| | | | | |
| Rp.2 | | | | 15minでdiv |
| パロノセトロン静注0.75mg | 5mL | 1 | V | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| ★アプレピタントカプセルの処方を確認してください | | | | |
| | | | | |
| Rp.3 | | | | 120minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| CSTDを使用 | | | | |
| 注射用ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ500mg | | | mg | |
| 注射用ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ100mg | | | mg | |
| | 750mg/㎡ | | | |
| 生理食塩液250mL | 250mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.4 | | | | 30minでdiv |
| *ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液50mg | 25mL | | mg | |
| *ﾄﾞｷｿﾙﾋﾞｼﾝ塩酸塩注射液10mg | 5mL | | mg | |
| | 50mg/㎡ | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.5 | | | | 15minでdiv |
| *ｵﾝｺﾋﾞﾝ注射用1mg | | | mg | |
| (最大2mg/body) | 1.4mg/㎡ | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.6 | | | | 60minでdiv |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| ★ガザイバ投与30分～60分前にカロナール1000mgを服用 | | | | |
| | | | | |
| Rp.7 | | | | IV(側管) |
| ポララミン注5mg | 1mL | 1 | A | |
| ガザイバ投与30分～60分前に投与 | | | | |
| | | | | |
| Rp.8 | 25mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に25mL/hずつ上げて、最大100mL/hまで(前回投与時に問題がなかった場合) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| ●ガザイバ点滴静注1000mg | 40mL | 1000 | mg | |
| | 1000mg/body | | | |
| 生理食塩液250mL | 250mL | 210 | mL | |
| ★ガザイバ投与開始30分前までにプレドニンを服用 | | | | |
| | | | | |
| Rp.9 | | | | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| | | | | |
| | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |