

レジメンNo	血液NHL64	システム登録No	12064
レジメン名	エブコリタマブ(1コース目・投与遅延後の再開)	診療科	血液内科
薬品名	エブキンリ		
一般名	エブコリタマブ		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2024/1/26
2024/1/26

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休
エブキンリ																												
エブキンリ								★																				
エブキンリ															★								★					

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
エブキンリ皮下注4mg	0.8mL		mg	
	0.16mg/body			
★投与30～120分前にプレドニン100mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
★day2-day4にプレドニン100mgを服用				
生理食塩液20mL	20mL	12.2	mL	
希釈用生食(4.2mL+8.0mL)				
①薬液0.8mLを生食4.2mLで希釈(0.8mg/mL)				
②0.8mg/mLの希釈液2.0mLを生食8.0mLで希釈(0.16mg/mL)				
③0.16mg/mLの希釈液から1.0mLを採取				

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
エブキンリ皮下注4mg	0.8mL		mg	
	0.8mg/body			
★投与30～120分前にプレドニン100mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
★day9-day11にプレドニン100mgを服用				
生理食塩液20mL	20mL	4.2	mL	
希釈用生食(4.2mL)				
①薬液0.8mLを生食4.2mLで希釈(0.8mg/mL)				
②0.8mg/mLの希釈液から1.0mLを採取				

15日目、22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
エブキンリ皮下注48mg	0.8mL		mg	
	48mg/body			
★投与30～120分前にプレドニン100mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
★day16-day18、day23-day25にプレドニン100mgを服用				