

レジメンNo	血液NHL77	システム登録No	12077
レジメン名	R-CEOP(1コース目)	診療科	血液内科

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2026.1.27
2026.1.27

薬品名	リツキシマブBS+エンドキサン+エトポシド+オンコビン+プレドニン		
一般名	リツキシマブBS+シクロホスファミド+エトポシド+ビンクリスチン+プレドニゾロン		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
エンドキサン	CPA	750mg/m ²	★																				
オンコビン	VCR	1.4mg/m ²	★																				
エトポシド(IV)	VP-16	50mg/m ²	★																				
エトポシド(PO)	VP-16	100mg/m ²		★	★																		
リツキシマブ	R	375mg/m ²	★																				
プレドニン	PSL	100mg/body	★	★	★	★	★																

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				60minでdiv
エトポシド点滴静注100mg			mg	
	50mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
★day2-day3にラステットカプセル(100mg/m ²)の処方を確認				
Rp.4				120minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
注射用エンドキサン500mg			mg	
注射用エンドキサン100mg			mg	
	750mg/m ²			
生理食塩液250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				15minでdiv
*オンコビン注射用1mg			mg	
(最大2mg/body)	1.4mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.6				
生理食塩液50mL		1	B	15minでdiv
★投与30分前にカロナール500mgを服用				
Rp.7				IV(側管)
ポララミン注5mg		1	A	
Rp.8				30minでdiv
ソル・コーテフ注射用100mg		1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.9				50mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に50mL/hずつ上げて、最大400mL/hまで
リツキシマブBS点滴静注500mg	50mL		mg	
リツキシマブBS点滴静注100mg	10mL		mg	
	375mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
リツキシマブの投与量(mL)×9倍の生理食塩液で希釈(1mg/mL)				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.10				15minでdiv
生理食塩液50mL		1	B	