レジメンNo	血液NHL78	システム登録No	12078
レジメン名	R-CEOP（2コース目-）	診療科	血液内科
薬品名	リツキシマブBS＋エンドキサン+エトポシド+オンコビン+プレドニン		
一般名	リツキシマブBS＋シクロホスファミド+エトポシド+ビンクリスチン+プレドニゾロン		
対象疾患	非ホジキンリンパ腫		

ページNo 1/2
作成日 2026.1.27
最終更新日 2026.1.27

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
エンドキサン	CPA	750mg/㎡	★																				
オンコビン	VCR	1.4mg/㎡	★																				
エトポシド(IV)	VP-16	50mg/㎡	★																				
エトポシド(PO)	VP-16	100mg/㎡		★	★																		
リツキシマブ	R	375mg/㎡	★																				
プレドニン	PSL	100mg/body	★	★	★	★	★																

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				60minでdiv
ｴﾄﾎﾟｼﾄﾞ点滴静注液100mg			mg	
	50mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
3にラステットカプセル（100mg/㎡）の処方を確認				
Rp.4				120minでdiv
混注指示必須				
CSTDを使用				
注射用ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ500mg			mg	
注射用ｴﾝﾄﾞｷｻﾝ100mg			mg	
750mg/㎡				
生理食塩液250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				15minでdiv
*ｵﾝｺﾋﾞﾝ注射用1mg			mg	
（最大2mg/body）	1.4mg/㎡			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.6				
生理食塩液50mL		1	B	30minでdiv
★投与30分前にカロナール500mgを服用				
Rp.7				IV（側管）
ポララミン注5mg		1	A	
Rp.8	100mL/hの速度で点滴静注を開始し、30分毎に100mL/hずつ上げて、最大400mL/hまで（前回投与時に問題がなかった場合）			
リツキシマブBS点滴静注500mg	50mL		mg	
リツキシマブBS点滴静注100mg	10mL		mg	
	375mg/㎡			
生理食塩液500mL	500mL		mL	
リツキシマブの投与量(mL)×9倍の生理食塩液で希釈(1mg/mL)				
Rp.9				15minでdiv
生理食塩液50mL		1	A	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間