

レジメンNo	血液MM29	システム登録No	13029
レジメン名	ERd[50kg-90kg](1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	エムプリシティ+レブラミド+レナデックス(デキサート)		
一般名	エロツズマブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/3  
2020.8.26  
2020.8.26

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
エムプリシティ	★							★							★							★						
デキサート	★							★							★							★						
レブラミド(内服)	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス(内服)	★							★							★							★						

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.5				0-30min:30mL/h,30min-1h:60mL/h,1h以降:120mL/h
混注指示必須				
●エムプリシティ点滴静注用400mg			mg	
●エムプリシティ点滴静注用300mg			mg	
	10mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
300mg:13mL/V、400mg:17mL/Vの注射用水で溶解(25mg/mL)				
生理食塩液250mL	250mL	250	mL	
250mLの生理食塩液液で希釈				

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.5				0-30min:180mL/h,30min以降:240mL/h
混注指示必須				
●エムプリシティ点滴静注用400mg			mg	
●エムプリシティ点滴静注用300mg			mg	
	10mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
300mg:13mL/V、400mg:17mL/Vの注射用水で溶解(25mg/mL)				
生理食塩液250mL	250mL	250	mL	
250mLの生理食塩液液で希釈				
(前回投与時にinfusion reactionが認められなかった場合)				

レジメンNo	血液MM29	システム登録No	13029
レジメン名	ERd[50kg-90kg](1コース目)	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	エムプリシティ+レブラミド+レナデックス(デキサート) エロツズマブ+レナリドミド+デキサメタゾン 多発性骨髄腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

2/3  
2020.8.26  
2020.8.26

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
エムプリシティ		10mg/kg	★							★							★							★								
デキサート	DEX	6.6mg/body	★							★							★							★								
レブラミド (内服)		25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★								
レナデックス (内服)	DEX	28mg/body	★							★							★							★								

15日目, 22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.5				300mL/h
混注指示必須				
●エムプリシティ点滴静注用400mg			mg	
●エムプリシティ点滴静注用300mg			mg	
	10mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
300mg:13mL/V、400mg:17mL/Vの注射用水で溶解(25mg/mL)				
生理食塩液250mL	250mL	250	mL	
250mLの生理食塩液で希釈				
(前回投与時にinfusion reactionが認められなかった場合)				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

まつもと医療センターがん化学療法チーム会・薬剤部 2020年4月