

| | | | |
|--------|-------------------------|----------|-------|
| レジメンNo | 血液MM49 | システム登録No | 13049 |
| レジメン名 | [皮下]DKd(7コース目-)75歳以下 | 診療科 | 血液内科 |
| 薬品名 | ダラキューロ+カイプロリス+レナデックス | | |
| 一般名 | ダラツムマブ+カルフィルゾミブ+デキサメタゾン | | |
| 対象疾患 | 多発性骨髄腫 | | |

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2021.6.3
2021.6.3

| day | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 投与スケジュール | | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ダラキューロ | 1800mg/body | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カイプロリス | 56mg/m ² | ★ | ★ | | | | | | ★ | ★ | | | | | | ★ | ★ | | | | | | | | | | | | |
| レナデックス (内服) | DEX 20mg/body | ★ | ★ | | | | | | ★ | ★ | | | | | | ★ | ★ | | | | | | | | | | | | |
| レナデックス (内服) | DEX 40mg/body | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---------------------|----|----|-----------|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| ★カイプロリス投与30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mg、モンテルカスト10mgを服用 | | | | |
| Rp.2 | | | | 30minでdiv |
| 5%ブドウ糖液100mL | 100mL | 1 | B | |
| Rp.3 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| カイプロリス点滴静注用40mg | | | mg | |
| カイプロリス点滴静注用10mg | | | mg | |
| | 56mg/m ² | | | |
| 注射用水20mL | 20mL | | mL | |
| 5%ブドウ糖液100mL | 100mL | 50 | mL | |
| 1Vあたり40mgは20mL、10mgは5mLの注射用水で溶解(2mg/mL) | | | | |
| Rp.4 | | | | 30minでdiv |
| 5%ブドウ糖液100mL | 100mL | 1 | B | |
| ★レナデックス: day1、day2、day8、day9、day15、day16は20mg、day22は40mgを処方してください | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|-------------------|-------------|----|----|---------|
| Rp.5 | | | | 3~5分でsc |
| ダラキューロ配合皮下注 | 15mL | 15 | mL | |
| | 1800mg/body | | | |
| カイプロリス投与終了後に投与開始可 | | | | |

2日目、8日目、9日目、15日目、16日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---------------------|----|------|-----------|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| ★カイプロリス投与30分前にレナデックス20mgを服用 | | | | |
| Rp.2 | | | | 30minでdiv |
| 5%ブドウ糖液100mL | 100mL | 1 | B | |
| Rp.3 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| カイプロリス点滴静注用40mg | | | mg | |
| カイプロリス点滴静注用10mg | | | mg | |
| | 56mg/m ² | | | |
| 注射用水20mL | 20mL | | mL | |
| 5%ブドウ糖液100mL | 50 | | mL B | |
| 1Vあたり40mgは20mL、10mgは5mLの注射用水で溶解(2mg/mL) | | | | |
| Rp.4 | | | | 30minでdiv |
| 5%ブドウ糖液100mL | 100mL | 1 | B | |
| ★レナデックス: day1、day2、day8、day9、day15、day16は20mg、day22は40mgを処方してください | | | | |