レジメンNo	血液MM73	システム登録No	13073
レジメン名	isa-d(2コース目-)	診療科	血液内科
薬品名	サークリサ+レナデックス		
一般名	イサツキシマブ+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo	1/2
作成日	2024.7.23
最終更新日	2024.7.23

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール			●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休
サークリサ	isa	20mg/kg	★														★													
レナデックス（内服）	DEX	40mg/body	★							★							★							★						
（※75歳超え：デキサメタゾン内服20mg）																														

1日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★サークリサ投与15～30分前にレナデックス40mg（75歳超は20mg）、カロナール1000mgを服用				
★day8,day22のレナデックスの処方を確認				
Rp.2				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp1の側管からサークリサ投与15～30分前に				
Rp.4				IV
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5	0-1h:175mg/h,1-1.5h:275mg/h,1.5h-2h:375mg/h,2h以降:400mg/h			
混注指示必須				
●サークリサ点滴静注500mg	25mL		mg	
●サークリサ点滴静注100mg	5mL		mg	
	20mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
合計250mLとなるように生理食塩液で希釈				
点滴速度(ml/h)=投与速度(mg/h)×12.5/体重				
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間