レジメンNo	血液MM74	システム登録No	13074
レジメン名	isaVRd(1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	イサツキシマブ＋ボルテゾミブ+レナリドミド+レナデックス		
一般名	サークリサ＋ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo 1/4
作成日 2025.5.14
最終更新日 2025.7.12

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休
サークリサ	isa	10mg/kg	★							★							★							★							★													
ボルテゾミブ		1.3mg/㎡	★			★				★			★											★			★				★			★									
レナリドミド（内服）		25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス（内服）	DEX	20mg/body	★	(★)		★	(★)			★	(★)		★	(★)			★							★	(★)		★	(★)			★	(★)		★	(★)								
※（★）は75歳以下の場合は服用																																										

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★サークリサ投与15～30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mgを服用				
★レナデックス：day1、2、4、5、8、9、11、12、15、22、23、25、26、29、30、32、33に20mg(75歳超はday1、4、8、11、15、22、25、29、32に20mg)				
★レナリドミドの処方を確認してください(day1-14、day22-35)				
Rp.2				sc
ボルテゾミブ注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				
Rp.3				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
Rp.4				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				
Rp.5				IV
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6	0-60分：25mL/h、60-90分：50mL/h、90-120分：75mL/h、120-150分：100mL/h、150-180分：125mL/h、180分-投与終了まで：150ml/h　合計200分でdiv			
混注指示必須				
●サークリサ点滴静注500mg	25mL		mg	
●サークリサ点滴静注100mg	5mL		mg	
	10mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
合計250mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.7				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

4、11、25、32日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
ボルテゾミブ注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

レジメンNo	血液MM74	システム登録No	13074
レジメン名	isaVRd(1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	イサツキシマブ＋ボルテゾミブ+レナリドミド+レナデックス		
一般名	サークリサ＋ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

作成日 2025.5.14
最終更新日 2025.7.12

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休
サークリサ	isa	10mg/kg	★							★							★							★							★													
ボルテゾミブ		1.3mg/㎡	★			★				★			★											★			★				★			★									
レナリドミド（内服）		25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
レナデックス（内服）	DEX	20mg/body	★	(★)		★	(★)			★	(★)		★	(★)			★							★	(★)		★	(★)			★	(★)		★	(★)								
※（★）は75歳以下の場合は服用																																										

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★サークリサ投与15～30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mgを服用				
★レナデックス：day1、2、4、5、8、9、11、12、15、22、23、25、26、29、30、32、33に20mg(75歳超はday1、4、8、11、15、22、25、29、32に20mg)				
★レナリドミドの処方を確認してください(day1-14、day22-35)				
Rp.2				sc
ボルテゾミブ注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				
Rp.3				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
Rp.4				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				
Rp.5				IV
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6	0-30分：50mL/h、30-60分：100mL/h、60分-投与終了まで：200mL/h 合計113分でdiv			
混注指示必須				
●サークリサ点滴静注500mg	25mL		mg	
●サークリサ点滴静注100mg	5mL		mg	
	10mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
合計250mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.7				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★サークリサ投与15～30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mgを服用				
★レナデックス：day1、2、4、5、8、9、11、12、15、22、23、25、26、29、30、32、33に20mg(75歳超はday1、4、8、11、15、22、25、29、32に20mg)				
★レナリドミドの処方を確認してください(day1-14、day22-35)				
Rp.2				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				
Rp.4				IV
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				

レジメンNo	血液MM74	システム登録No	13074
レジメン名	isaVRd(1コース目)	診療科	血液内科
薬品名	イサツキシマブ＋ボルテゾミブ+レナリドミド+レナデックス		
一般名	サークリサ＋ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo 4/4
作成日 2025.5.14
最終更新日 2025.7.12

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	休
サークリサ	isa	10mg/kg	★							★							★							★							★													
ボルテゾミブ		1.3mg/㎡	★			★				★			★											★			★				★			★									
レナリドミド（内服）		25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★								★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
レナデックス（内服）	DEX	20mg/body	★	(★)		★	(★)			★	(★)		★	(★)			★							★	(★)		★	(★)			★	(★)		★	(★)								
※（★）は75歳以下の場合は服用																																										

22、29日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5	75分でdiv			
混注指示必須				
●サークリサ点滴静注500mg	25mL		mg	
●サークリサ点滴静注100mg	5mL		mg	
	10mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
合計250mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★サークリサ投与15～30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mgを服用				
★レナデックス：day1、2、4、5、8、9、11、12、15、22、23、25、26、29、30、32、33に20mg(75歳超はday1、4、8、11、15、22、25、29、32に20mg)				
★レナリドミドの処方を確認してください(day1-14、day22-35)				
Rp.2				sc
ボルテゾミブ注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				
Rp.3				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
Rp.4				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				
Rp.5				IV
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6	75分でdiv			
混注指示必須				
●サークリサ点滴静注500mg	25mL		mg	
●サークリサ点滴静注100mg	5mL		mg	
	10mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
合計250mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	