レジメンNo	血液MM75	システム登録No	13075
レジメン名	isaVRd(5-17コース目)	診療科	血液内科
薬品名	ボルテゾミブ+レナリドミド+レナデックス		
一般名	ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo	1/2
作成日	2025.5.14
最終更新日	2025.5.14

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
サークリサ	isa	10mg/kg	★														★													
レブラミド（内服）		25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス（内服）	DEX	20mg/body	★							★							★							★						

1、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★サークリサ投与15～30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mgを服用				
★レナデックス：day1、8、15、22に20mg				
★レナリドミドの処方を確認してください(day1-21)				
Rp.2				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv
Rp.3				IV
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液20mL	20mL	1	B	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				
Rp.4				IV
ポララミン注5mg	1mL	1	A	
Rp2の側管からサークリサ投与15～30分前に				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5	75分でdiv			
混注指示必須				
●サークリサ点滴静注500mg	25mL		mg	
●サークリサ点滴静注100mg	5mL		mg	
	10mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
合計250mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.6				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間