

レジメンNo	血液MM76	システム登録No	13076
レジメン名	isaVRd(18コース目-)	診療科	血液内科
薬品名	ボルテゾミブ+レナリドミド+レナデックス		
一般名	ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2025.5.14  
2025.5.14

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
サークリサ	isa	10mg/kg	★																											
レナリドミド (内服)		25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス (内服)	DEX	20mg/body	★							★							★							★						

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間	薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間	薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1					Rp.5									
生理食塩液50mL	50mL	1	B						75分でdiv					
血管確保用					混注指示必須									
★サークリサ投与15~30分前にレナデックス20mg、カロナール1000mgを服用					●サークリサ点滴静注500mg				25mL	mg				
★レナデックス: day1、8、15、22に20mg					●サークリサ点滴静注100mg				5mL	mg				
★レナリドミドの処方を確認してください(day1-21)									10mg/kg					
					生理食塩液250mL	250mL			mL					
Rp.2					合計250mLとなるように生理食塩液で希釈									
生理食塩液100mL	100mL	1	B	30minでdiv										
					Rp.6				15minでdiv					
Rp.3				IV	生理食塩液50mL	50mL	1	B						
ファモチジン注射用20mg		1	A											
生理食塩液20mL	20mL	1	B											
Rp2の側管からサークリサ投与15~30分前に														
Rp.4				IV										
ポララミン注5mg	1mL	1	A											
Rp2の側管からサークリサ投与15~30分前に														