

| | | | |
|--------|------------------------------|----------|-------|
| レジメンNo | 血液MM87 | システム登録No | 13087 |
| レジメン名 | [皮下]Dara-VRd(3-6コース目)[移植適応] | 診療科 | 血液内科 |
| 薬品名 | ダラキューロ+ボルテゾミブ+レナリドミド+レナデックス | | |
| 一般名 | ダラツムマブ+ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン | | |
| 対象疾患 | 多発性骨髄腫 | | |

ページNo 1/2
 作成日 2025.10.20
 最終更新日 2025.10.20

| day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 投与スケジュール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ダラキューロ | ★ | | | | | | | | | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | |
| ボルテゾミブ | ★ | | | ★ | | | | ★ | | | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レナリドミド | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | | | |
| レナデックス (内服) | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | ★ | ★ | ★ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|--|----------------------|-----|----|---------|
| Rp.1 | | | | 3~5分でsc |
| 混注指示必須 | | | | |
| ダラキューロ配合皮下注 | 15mL | 15 | mL | |
| | 1800mg/body | | | |
| ★ダラキューロ投与1~3時間前にレナデックス40mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 | | | | |
| ★day1-day21にレナリドミド25mg、day1-day4、day9-day12にレナデックス40mgの処方を確認 | | | | |
| Rp.2 | | | | sc |
| ボルテゾミブ注射用3mg | | | mg | |
| | 1.3mg/m ² | | | |
| 生理食塩液20mL | 20mL | 1.2 | mL | |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) | | | | |

4日目、8日目、11日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|--|----------------------|-----|----|------|
| Rp.1 | | | | sc |
| 混注指示必須 | | | | |
| ボルテゾミブ注射用3mg | | | mg | |
| | 1.3mg/m ² | | | |
| 生理食塩液20mL | 20mL | 1.2 | mL | |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) | | | | |
| ★day1-day21にレナリドミド25mg、day1-day4、day9-day12にレナデックス40mgの処方を確認 | | | | |

15日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|--|-------------|----|----|---------|
| Rp.1 | | | | 3~5分でsc |
| 混注指示必須 | | | | |
| ダラキューロ配合皮下注 | 15mL | 15 | mL | |
| | 1800mg/body | | | |
| ★ダラキューロ投与1~3時間前にレナデックス10mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 | | | | |