レジメンNo	血液MM89	システム登録No	13089
レジメン名	[皮下]Dara-VRd(1-2コース目)[移植非適応]	診療科	血液内科
薬品名	ダラキューロ+ボルテゾミブ+レナリドミド+レナデックス		
一般名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo	1/2
作成日	2026.2.10
最終更新日	2026.2.10

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
ダラキューロ		1800mg/body	★							★							★						
ボルテゾミブ		1.3mg/㎡	★			★				★			★										
レナリドミド		25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス（内服）	DEX	20mg/body	★	★		★	★			★	★		★	★									
（※75歳超はデキサメタゾン40mg/weekも可）																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3～5分でsc
混注指示必須				
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与1～3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mg、モンテルカスト10mgを服用				
★day1-14にレナリドミド25mg、day1-2、day4-5、day8-9、day11-12にレナデックス20mgの処方を確認				
★75歳超、BMI18.5未満はday1、day4、day8、day11に投与も可				
Rp.2				sc
ボルテゾミブ注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

4日目、11日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
ボルテゾミブ注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				
★day1-14にレナリドミド25mg、day1-2、day4-5、day8-9、day11-12にレナデックス20mgの処方を確認				
★75歳超、BMI18.5未満はday1、day4、day8、day11に投与も可				

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3～5分でsc
混注指示必須				
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与1～3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
★day1-14にレナリドミド25mg、day1-2、day4-5、day8-9、day11-12にレナデックス20mgの処方を確認				
★75歳超、BMI18.5未満はday1、day4、day8、day11に投与も可				
Rp.2				sc
ボルテゾミブ注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

レジメンNo	血液MM86	システム登録No	13086
レジメン名	[皮下]Dara-VRd(1-2コース目)[移植非適応]	診療科	血液内科
薬品名	ダラキューロ+ベルケイド+レナリドミド+レナデックス		
一般名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+レナリドミド+デキサメタゾン		
対象疾患	多発性骨髄腫		

ページNo	1/2
作成日	2025.10.20
最終更新日	2025.10.20

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
ダラキューロ		1800mg/body	★							★							★						
ボルテゾミブ		1.3mg/㎡	★			★				★			★										
レナリドミド		25mg/body	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★							
レナデックス（内服）	DEX	20mg/body	★	★		★	★			★	★		★	★									
（※75歳超はデキサメタゾン20mg/weekも可）																							

15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3～5分でsc
混注指示必須				
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与1～3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				