

レジメンNo	血液ALL13	システム登録No	16013
レジメン名	Ph+ALL213(C1、60歳以上65歳未満)	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	メトトレキサート+シタラビン+ソル・メドロール+ダサチニブ メトトレキサート+シタラビン+メチルプレドニゾン+ダサチニブ 急性リンパ性白血病		

ページNo
作成日
最終更新日

1/5
2023.5.25
2023.5.25

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
メトトレキサート	MTX	1000mg/m ²	★																									
シタラビン	Ara-C	1000mg/m ² ×2		★★★	★★★																							
ソル・メドロール	mPSL	50mg/body×2	★★	★★	★★																							
ロイコボリン	LV	15mg/回		2	4	2																						
LVは表の記載回数を6h毎に投与 (MTXの血中濃度が0.1μmol/L未満になるまで継続)																												
ダサチニブ		100mg/body				★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★		

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(メイン)①				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	0:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.2(メイン)②				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	4:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.3(メイン)③				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	8:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.4(メイン)④				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	12:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.5(メイン)⑤				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	16:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.6(メイン)⑥				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	20:00
ソルデム3A	500mL	1	B	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(メイン)①				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	0:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.2(メイン)②				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	4:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.3(メイン)③				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	8:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.4(メイン)④				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	12:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.5(メイン)⑤				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	16:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.6(メイン)⑥				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	20:00
ソルデム3A	500mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.7(側管)①				30minでdiv
ソル・メドロール静注用40mg		50	mg	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★ダイアモックスの処方を確認してください				
Rp.8(側管)②				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★アプレピタントカプセルの処方を確認してください				
ダサチニブ(day4-)の処方を確認してください				
Rp.9(側管)③				24hでdiv
混注指示必須				
メトトレキサート点滴静注液1000mg	40mL		mg	
メトトレキサート点滴静注液200mg	8mL		mg	
	1000mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.10(側管-2)①				30minでdiv
ソル・メドロール静注用40mg		50	mg	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
前回のソル・メドロール投与開始から12時間後に投与開始				

レジメンNo	血液ALL13	システム登録No	16013
レジメン名	Ph+ALL213(C1、60歳以上65歳未満)	診療科	血液内科
薬品名	メトトレキサート+シタラビン+ソル・メドロール+ダサチニブ		
一般名	メトトレキサート+シタラビン+メチルプレドニゾン+ダサチニブ		
対象疾患	急性リンパ性白血病		

ページNo
作成日
最終更新日

2/5
2023.5.25
2023.5.25

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メトトレキサート	MTX	1000mg/m ²	★																					
シタラビン	Ara-C	1000mg/m ² ×2		★★★																				
ソル・メドロール	mPSL	50mg/body×2	★★	★★★																				
ロイコボリン	LV	15mg/回		2	4	2																		
LVは表の記載回数を6h毎に投与 (MTXの血中濃度が0.1 μmol/L未満になるまで継続)																								
ダサチニブ		100mg/body			★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.7(側管)①				30minでdiv
ソル・メドロール静注用40mg		50	mg	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
シタラビン投与前に投与				
Rp.8(側管)②				180minでdiv
混注指示必須				
シタラビン点滴静注液1g	50mL		mg	
シタラビン点滴静注液400mg	20mL		mg	
			1000mg/m ²	
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.9(側管)③				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.10(側管)④				30minでdiv
ソル・メドロール静注用40mg		50	mg	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
前回のソル・メドロール投与開始から12時間後に投与開始				

3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(メイン)①				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	0:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.2(メイン)②				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	4:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.3(メイン)③				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	8:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.4(メイン)④				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	12:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.5(メイン)⑤				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	16:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.6(メイン)⑥				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	20:00
ソルデム3A	500mL	1	B	

レジメンNo	血液ALL13	システム登録No	16013
レジメン名	Ph+ALL213(C1、60歳以上65歳未満)	診療科	血液内科
薬品名	メトトレキサート+シタラビン+ソル・メドロール+ダサチニブ		
一般名	メトトレキサート+シタラビン+メチルプレドニゾン+ダサチニブ		
対象疾患	急性リンパ性白血病		

ページNo
作成日
最終更新日

3/5
2023.5.25
2023.5.25

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
メトトレキサート	MTX	1000mg/m ²	★																					
シタラビン	Ara-C	1000mg/m ² ×2		★★★	★★★																			
ソル・メドロール	mPSL	50mg/body×2	★★	★★	★★																			
ロイコボリン	LV	15mg/回		2	4	2																		
LVは表の記載回数を6h毎に投与（MTXの血中濃度が0.1μmol/L未満になるまで継続）																								
ダサチニブ		100mg/body			★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★

3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.7(側管)①				30minでdiv
ソル・メドロール静注用40mg		50	mg	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
シタラビン投与前に投与				
Rp.8(側管)②				180minでdiv
混注指示必須				
シタラビン点滴静注液1g	50mL		mg	
シタラビン点滴静注液400mg	20mL		mg	
	1000mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
Rp.9(側管)③				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.10(側管)④				30minでdiv
ソル・メドロール静注用40mg		50	mg	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
前回のソル・メドロール投与開始から12時間後に投与開始				

4日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.11(側管)⑤				180minでdiv
シタラビン点滴静注液1g	50mL		mg	
シタラビン点滴静注液400mg	20mL		mg	
	1000mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	
前回のシタラビン投与開始から12時間後に投与開始				
Rp.12(側管)⑥				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.13(側管-2)①				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				
Rp.14(側管-2)②				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				
Rp.15(側管-2)②				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				
Rp.16(側管-2)②				iv
ロイコボリン注3mg	1mL	5	A	
前回のロイコボリン投与から6時間後				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1(メイン)①				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	0:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.2(メイン)②				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	4:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.3(メイン)③				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	8:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.4(メイン)④				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	12:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.5(メイン)⑤				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	16:00
ソルデム3A	500mL	1	B	
Rp.6(メイン)⑥				4hでdiv
メイロン静注7% 20mL	20mL	1	A	20:00
ソルデム3A	500mL	1	B	

