

レジメンNo	血液ALL16	システム登録No	16016
レジメン名	PSL+VCR+DXR+PEG-Asp	診療科	血液内科

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/3  
2024.7.4  
2024.7.30

薬品名 一般名 対象疾患	オンコビン+ドキソルビシン+プレドニン+オンキヤスパ+キロサイド+メソトレキセート		
	ビンクリスチン+ドキソルビシン+プレドニロン+PEG-アスパラギナーゼ+シタラビン+メソトレキセート		
	急性リンパ性白血病		

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
プレドニン	PSL	40mg/m <sup>2</sup>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
オンコビン	VCR	2mg/body	★							★																						
ドキソルビシン	DXR	30mg/m <sup>2</sup>	★	★																												
オンキヤスパ	PEG-Asp	500U/m <sup>2</sup>							★																							
キロサイド (IT)	AraC	50mg/body	★																													
メソトレキセート (IT)	MTX																															
(※60歳以上：プレドニンday1-7内服)																																

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
混注指示必須				
Rp.1				IT
キロサイド注40mg	2mL	50	mg	
	50mg/body			
生理食塩液20mL	20mL	2.5	mL	
全量5mLとして調製				
Rp.2				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.3				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★プレドニン day1-21(60歳以上の場合、day1-7)の処方を確認				
Rp.4				30minでdiv
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	
ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
	30mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
混注指示必須				
ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg	25mL		mg	
ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg	5mL		mg	
	30mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				iv
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit	

レジメンNo	血液ALL16	システム登録No	16016
レジメン名	PSL+VCR+DXR+PEG-Asp	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	オンコピン+ドキシソルピシン+プレドニン+オンキヤスパ+キロサイド+メントレキセート ビンクリスチン+ダウノルビシン+プレドニゾロン+PEG-アスパラギナーゼ+シタラビン+メントレキセート 急性リンパ性白血病		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/3  
2024.7.4  
2024.7.30

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
投与スケジュール	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	●	
プレドニン	PSL	40mg/m <sup>2</sup>	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★								
オンコピン	VCR	2mg/body	★					★							★							★								
ドキシソルピシン	DXR	30mg/m <sup>2</sup>	★	★																										
オンキヤスパ	PEG-Asp	500U/m <sup>2</sup>						★																						
キロサイド (IT)	AraC	50mg/body	★																											
メントレキセート (IT)	MTX																													★

(※60歳以上：プレドニンday1-7内服)

7日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★最小度催吐性リスクのため制吐薬は原則不要				
Rp.2				2時間でdiv
混注指示必須				
オンキヤスパ点滴静注用3750			IU	
	500IU/m <sup>2</sup>			
注射用水20mL	20mL	5.2	mL	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★オンキヤスパ投与30分～60分前にカロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
Rp.3				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				iv
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit	

8,15,22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★最小度催吐性リスクのため制吐薬は原則不要				
Rp.2				15minでdiv
混注指示必須				
オンコピン注射用1mg			mg	
	2mg/body			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				15minでdiv
生理食塩液50mL		1	B	

29日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				IT
混注指示必須				
注射用メントレキセート5mg		12	mg	
	12mg/body			
生理食塩液20mL	20mL	5	mL	
全量5mLとして調製				