

レジメンNo	血液HSCT14	システム登録No	91014
レジメン名	FLU+MEL+TBI	診療科	血液内科
薬品名 一般名 対象疾患	フルダラ+アルケラン(+全身放射線照射) フルダラビン+メルファラン(+全身放射線照射) 同種移植前処置		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2023/12/4
2023/12/4

day			-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	休
フルダラ	FLU	25mg/m ²	★	★	★	★	★		
メルファラン	MEL	80mg/m ²						★	

-7~-3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでivh
グラニセトロン静注3mg	3mL	1	A	9:45
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				30minでivh
混注指示必須				
フルダラ静注用50mg			mg	10:00
	25mg/m ²			
注射用水20mL	20mL		mL	
2.5mL/Vの注射用水で溶解(20mg/mL)				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
CCr20~47mL/分/m ² の場合は次式に基づいて投与量を決定				
投与量[mg]=30 × (0.4+0.01 × CCr[mL/分/m ²]) × BSA				
Rp.4				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	10:30
Rp.5				iv
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit	

-2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでivh
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	10:45
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				20minでivh
*アルケラン静注用50mg			mg	11:00
	80mg/m ²			
★調製後90分以内に投与を完了する				
フィルター使用不可				
クライオセラピーの指示を確認				
アルケラン投与前日から投与後24時間は 2000mL/日以上の補液を				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間