

レジメンNo	血液HSCT15	システム登録No	91015
レジメン名	FLU+MEL140	診療科	血液内科
薬品名	フルダラ+アルケラン		
一般名	フルダラビン+メルファラン		
対象疾患	同種移植前処置		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/3  
2025/1/14  
2025/1/14

day			-6	-5	-4	-3	-2	-1
投与スケジュール			●	●	●	●	●	休
フルダラ	FLU	25mg/m <sup>2</sup>	★	★	★	★	★	
メルファラン	MEL	70mg/m <sup>2</sup>				★	★	

-6~-4日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでivh
グラニセトロン静注液3mg	3mL	1	A	9:45
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				30minでivh
混注指示必須				
フルダラ静注用50mg			mg	10:00
	25mg/m <sup>2</sup>			
注射用水20mL	2.5mL		mL	
2.5mL/Vの注射用水で溶解(20mg/mL)				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
CCr20~47mL/分/m <sup>2</sup> の場合は次式に基づいて投与量を決定				
投与量[mg]=30×(0.4+0.01×CCr[mL/分/m <sup>2</sup> ])×BSA				
Rp.4				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	10:30
Rp.5				iv
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit	

-3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでivh
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	9:45
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				30minでivh
混注指示必須				
フルダラ静注用50mg			mg	10:00
	25mg/m <sup>2</sup>			
注射用水20mL	2.5mL		mL	
2.5mL/Vの注射用水で溶解(20mg/mL)				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
CCr20~47mL/分/m <sup>2</sup> の場合は次式に基づいて投与量を決定				
投与量[mg]=30×(0.4+0.01×CCr[mL/分/m <sup>2</sup> ])×BSA				
Rp.4				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	10:30

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				20minでivh
*アルケラン静注用50mg			mg	11:00
	70mg/m <sup>2</sup>			
★調製後90分以内に投与を完了する				
フィルター使用不可				
クライオセラピーの指示を確認				
アルケラン投与前日から投与後24時間は 2000mL/日以上の補液を実施				
Rp.6				30minでivh
生理食塩液100mL	100mL	1	B	11:20
Rp.7				iv
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ	10mL	1	kit	

