

レジメンNo	血液O2	システム登録No	92002
レジメン名	[皮下]DCyBorD(1-2コース目)	診療科	血液内科
薬品名	ダラキューロ+エンドキサン+ベルケイド+レナデックス		
一般名	ダラツムマブ+シクロホスファミド+ボルテゾミブ+デキサメタゾン		
対象疾患	全身性ALアミロイドーシス		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2023.3.3  
2023.3.3

day	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休	●	●	休	休	休	休	休
ダラキューロ	1800mg/body	★						★							★							★						
エンドキサン (内服)	CPA 300mg/m <sup>2</sup> <small>(max500mg/body)</small>	★						★							★							★						
ベルケイド	1.3mg/m <sup>2</sup>	★						★							★							★						
レナデックス (内服)	DEX 20mg/body	★	★					★	★						★	★						★	★					
(※70歳を越える、過小体重、血液量増加症、コントロール不良のDM、又はステロイド療法に対する忍容性がない若しくは有害事象を発現した患者にはデキサメタゾン20mg/weekも可)																												

1日目、8日目、15日目、22日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3〜5分でsc
<b>混注指示必須</b>				
ダラキューロ皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与1〜3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
エンドキサン錠/5-HT3受容体拮抗薬の処方を確認				
Rp.2				sc
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間