

| | | | |
|--------|-----------------|----------|-------------|
| レジメンNo | 呼吸器LC16 | システム登録No | 52016/62016 |
| レジメン名 | CDDP+GEM | 診療科 | 呼吸器内科/外科 |
| 薬品名 | シスプラチン+ゲムシタビン | | |
| 一般名 | シスプラチン+ゲムシタビン | | |
| 対象疾患 | 非小細胞肺癌 | | |

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2022.2.4
2023.2.7

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 投与スケジュール | | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| シスプラチン | CDDP | 80mg/m ² | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゲムシタビン | GEM | 1000mg/m ² | ★ | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|--------------------------|-----------------------|-----|----|-----------|
| Rp.1 | | | | 60minでdiv |
| 硫酸Mg補正液 | 20mL | 20 | mL | |
| 生理食塩液500mL | 500mL | 1 | B | |
| ★投与開始から3日間1日1L以上の飲水摂取 | | | | |
| Rp.2 | | | | 10minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 50 | mL | |
| Rp.3 | | | | 30minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| デキサート注射液3.3mg | 1mL | 1 | A | |
| グラニセトロン静注液3mg | 3mL | 1 | A | |
| プロイメド点滴静注用150mg | | 1 | V | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 100 | mL | |
| ★day2-day4にデキサメタゾン8mgを服用 | | | | |
| Rp.4 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| ゲムシタビン点滴静注用1g | | | mg | |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg | | | mg | |
| | 1000mg/m ² | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 100 | mL | |
| Rp.5 | | | | 60minでdiv |
| ソルデム3A輸液500mL | 500mL | 500 | mL | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|-----------------------|---------------------|-----|----|-----------|
| Rp.6 | | | | 60minでdiv |
| *シスプラチン注50mg | 100mL | | mg | |
| *シスプラチン注10mg | 20mL | | mg | |
| | 80mg/m ² | | | |
| 生理食塩液500mL | 500mL | | mL | |
| 全量500mLとなるように生理食塩液で希釈 | | | | |
| Rp.7 | | | | 60minでdiv |
| ソルデム3A輸液500mL | 500mL | 500 | mL | |
| Rp.8 | | | | iv |
| フロセミド注20mg | 2mL | 20 | mg | |
| Rp.7開始と同時に側管からワンショット | | | | |

8日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|------------------|-----------------------|-----|----|-----------|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| Rp.2 | | | | 15minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| グラニセトロン静注液3mg | 3mL | 1 | A | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 50 | mL | |
| Rp.3 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| ゲムシタビン点滴静注用1g | | | mg | |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg | | | mg | |
| | 1000mg/m ² | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 100 | mL | |
| Rp.4 | | | | 10minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 50 | mL | |