

| | | | |
|--------|---------------------------|----------|-------------|
| レジメンNo | 呼吸器LC79 | システム登録No | 52079/62079 |
| レジメン名 | ペムブロリズマブ+CDDP+GEM(術前補助療法) | 診療科 | 呼吸器内科/外科 |
| 薬品名 | キイトルーダ+シスプラチン+ゲムシタビン | | |
| 一般名 | ペムブロリズマブ+シスプラチン+ゲムシタビン | | |
| 対象疾患 | 非小細胞肺癌(扁平上皮癌) | | |

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2024.9.17
2024.9.17

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 投与スケジュール | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ペムブロリズマブ | 200mg/body | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| シスプラチン | CDDP 75mg/m ² | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゲムシタビン | GEM 1000mg/m ² | ★ | | | | | | ★ | | | | | | | | | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---------------------------|------------|-----|----|-----------|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| ★投与開始から3日間、1日1000mL以上の飲水を | | | | |
| Rp.2 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| ●キイトルーダ点滴静注100mg | 4mL | 200 | mg | |
| | 200mg/body | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| Rp.3 | | | | 10minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| Rp.4 | | | | 60minでdiv |
| 硫酸Mg補正液 | 20mL | 10 | mL | |
| 生理食塩液500mL | 500mL | 1 | B | |
| Rp.5 | | | | 30minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| デキサート注射液3.3mg | 1mL | 1 | A | |
| パロノセトロン静注0.75mg | 5mL | 1 | V | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| ★アプレピタントカプセルの処方を確認 | | | | |
| ★day2-day4にデキサメタゾン8mgを内服 | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|-----------------------|-----------------------|----|----|-----------|
| Rp.6 | | | | 30minでdiv |
| ゲムシタビン点滴静注1g | | | mg | |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg | | | mg | |
| | 1000mg/m ² | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| Rp.7 | | | | 60minでdiv |
| ソルデム3A輸液500mL | 500mL | 1 | B | |
| Rp.8 | | | | 60minでdiv |
| *シスプラチン注50mg | 100mL | | mg | |
| *シスプラチン注10mg | 20mL | | mg | |
| | 75mg/m ² | | | |
| 生理食塩液500mL | 500mL | | mL | |
| 全量500mLとなるように生理食塩液で希釈 | | | | |
| Rp.9 | | | | 60minでdiv |
| ソルデム3A輸液500mL | 500mL | 1 | B | |
| Rp.10 | | | | iv |
| フロセミド注20mg | 2mL | 1 | A | |
| Rp.9開始と同時に側管からワンショット | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|------------------|-----------------------|----|----|-----------|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| Rp.2 | | | | 15minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| Rp.3 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| ゲムシタビン点滴静注用1g | | | mg | |
| ゲムシタビン点滴静注用200mg | | | mg | |
| | 1000mg/m ² | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| Rp.4 | | | | 10minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |