

レジメンNo	消化器GC17	システム登録No	21017/31017
レジメン名	wPTX+Rmab	診療科	外科/消化器内科
薬品名	パクリタキセル+サイラムザ		
一般名	パクリタキセル+ラムシルマブ		
対象疾患	切除不能進行・再発胃癌		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2021.6.21  
2021.6.21

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
投与スケジュール			●	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	休	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
パクリタキセル	PTX	80mg/m <sup>2</sup>	★							★							★													
サイラムザ	Rmab	8mg/kg	★														★													

1日目、15日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
パラミン注5mg	1mL	1	A	
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3	初回は60minでdiv、2回目以降は30minでdiv可			
混注指示必須				
●サイラムザ点滴静注用500mg	50mL		mg	
●サイラムザ点滴静注用100mg	10mL		mg	
	8mg/kg			
生理食塩液250mL	250mL		mL	
全量250mLになるように生理食塩液で希釈				
Rp.4				60minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
infusion reactionの発現がなければ、3サイクル目以降は10分で投与可				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				60minでdiv
●パクリタキセル点滴静注100mg	16.7mL		mg	
●パクリタキセル点滴静注30mg	5mL		mg	
	80mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	
Rp.6				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

8日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
パラミン注5mg	1mL	1	A	
ファモチジン注射用20mg		1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.3				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4				60minでdiv
混注指示必須				
●パクリタキセル点滴静注100mg	16.7mL		mg	
●パクリタキセル点滴静注30mg	5mL		mg	
	80mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	
Rp.5				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv