レジメンNo	消化器GC29	システム登録No	21029/31029
レジメン名	CAPOX＋Zolbetuximab(2コース目-)	診療科	外科/消化器内科
薬品名	カペシタビン＋オキサリプラチン＋ビロイ		
一般名	カペシタビン+オキサリプラチン＋ゾルベツキシマブ		
対象疾患	CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌		

ページNo	1/2
作成日	2025.6.9
最終更新日	2025.6.9

CAPOX＋Zolbetuximab(2コース目-)

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
ビロイ		600mg/㎡	★																				
オキサリプラチン	L-OHP	130mg/㎡	★																				
カペシタビン	Cape	2000mg/㎡/日	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★						
カペシタビンはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
ホスアプレピタント点滴静注用150mg		1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★day0-day3にオランザピン5mgを服用(糖尿病の既往のある患者へは禁忌)				
★day2-day3にデキサメタゾン8mgを服用				
カペシタビン：day1夕食後～day15朝食後				
Rp.3				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	30minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.4	指示書参照			
混注指示必須				
●ビロイ点滴静注用100mg			mg	
	600mg/㎡			
大塚蒸留水20mL	20mL	1	A	
生理食塩液500mL	500mL	1	V	
2.0mg/mLとなるように生理食塩液で希釈				
1Vあたり5.0mLの注射用水で溶解(20mg/mL)				
調製後6時間以内に投与を完了すること				
Rp.5				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.6				120minでdiv
混注指示必須				
*オキサリプラチン点滴静注液100mg	20mL		mg	
*オキサリプラチン点滴静注液50mg	10mL		mg	
	130mg/㎡			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.7				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間