

レジメンNo	消化器GC30	システム登録No	21030/31030
レジメン名	mFOLFOX6+Zolbetuximab(1コース目)	診療科	外科/消化器内科

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2025.6.10
2025.6.10

薬品名	オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル+ピロイ		
一般名	オキサリプラチン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル+ゾルベツキシマブ		
対象疾患	CLDN18.2陽性の切除不能進行・再発胃癌		

mFOLFOX6 + Zolbetuximab(1コース目)																	
day				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール				●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ピロイ		800mg/m ²	★														
オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	★														
レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	★														
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	★														
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²		46時間													

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
ホスアプレピタント点滴静注用150mg		1	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
★day0-day3にオランザピン5mgを服用(糖尿病の既往のある患者へは禁忌)				
Rp.3				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	30minでdiv
Rp.4	指示書参照			
混注指示必須				
●ピロイ点滴静注用100mg			mg	
	800mg/m ²			
大塚蒸留水20mL	20mL	1	A	
生理食塩液500mL	500mL	1	V	
2.0mg/mLとなるように生理食塩液で希釈				
1Vあたり5.0mLの注射用水で溶解(20mg/mL)				
調製後6時間以内に投与を完了すること				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv
Rp.6(Rp.7の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m ²			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	
Rp.7				120minでdiv
*オキサリプラチン点滴静注液100mg	20mL		mg	
*オキサリプラチン点滴静注液50mg	10mL		mg	
	85mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
レボホリナートと同時に投与開始				
Rp.8				全開でdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
レボホリナート終了後				

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.9				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

