レジメンNo	消化器GC32	システム登録No	21032/31032
レジメン名	CAPOX+ペムブロリズマブ+Tmab（1コース目）	診療科	外科/消化器内科
薬品名	カペシタビン＋オキサリプラチン+ペムブロリズマブ+トラスツズマブ		
一般名	カペシタビン+オキサリプラチン+ペムブロリズマブ+トラスツズマブ		
対象疾患	切除不能進行・再発胃癌		

ページNo	1/2
作成日	2026.2.10
最終更新日	2026.2.10

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休
オキサリプラチン	L-OHP	130mg/㎡	★																				
カペシタビン	Cape	2000mg/㎡/日	★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★★	★					
トラスツズマブBS	Tmab	8mg/kg	★																				
ペムブロリズマブ		200mg/body	★																				
カペシタビンはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				30minでdiv
混注指示必須				
●キイトルーダ点滴静注100mg	4mL	200	mg	
	200mg/body			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv
Rp.4				90minでdiv
混注指示必須				
トラスツズマブBS注点滴静注用150mg			mg	
トラスツズマブBS注点滴静注用60mg			mg	
	8mg/kg			
注射用水20mL	20mL		mL	
生理食塩液250mL	250mL	1	B	
1Vあたり150mgは7.2mL、60mgは3.0mLの注射用水で溶解(21mg/mL)				
Rp.5				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				15minでdiv
パロノセトロン静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
★day2-day3にデキサメタゾン8mgを服用				
カペシタビン：day1夕食後～day15朝食後				
Rp.7				120minでdiv
*オキサリプラチン点滴静注液100mg	20mL		mg	
*オキサリプラチン点滴静注液50mg	10mL		mg	
	130mg/㎡			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
Rp.8				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間