| レジメンNo | 消化器GC33 | システム登録No | 21033/31033 |
|---|---|---|---|
| レジメン名 | CAPOX+ペムブロリズマブ+Tmab（2コース目-） | 診療科 | 外科/消化器内科 |
| 薬品名 | カペシタビン＋オキサリプラチン+キイトルーダ+トラスツズマブ | | |
| 一般名 | カペシタビン+オキサリプラチン+ペムブロリズマブ+トラスツズマブ | | |
| 対象疾患 | 切除不能進行・再発胃癌 | | |

| | |
|---|---|
| ページNo | 1/2 |
| 作成日 | 2026.2.10 |
| 最終更新日 | 2026.2.10 |

| day | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投与スケジュール | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| オキサリプラチン | L-OHP | 130mg/㎡ | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビン | Cape | 2000mg/㎡/日 | ★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★ | | | | | | |
| トラスツズマブBS | Tmab | 6mg/kg | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ペムブロリズマブ | | 200mg/body | ★ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| カペシタビンはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| | | | | |
| Rp.2 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| ●キイトルーダ点滴静注100mg | 4mL | 200 | mg | |
| | 200mg/body | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.3 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | 15minでdiv |
| | | | | |
| Rp.4 | | | | 30minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| トラスツズマブBS注点滴静注用150mg | | | mg | |
| トラスツズマブBS注点滴静注用60mg | | | mg | |
| | 6mg/kg | | | |
| 注射用水20mL | 20mL | | mL | |
| 生理食塩液250mL | 250mL | 1 | B | |
| 1Vあたり150mgは7.2mL、60mgは3.0mLの注射用水で溶解(21mg/mL) | | | | |
| | | | | |
| Rp.5 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | 15minでdiv |
| | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.6 | | | | 15minでdiv |
| パロノセトロン静注0.75mg | 5mL | 1 | V | |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| デキサート注射液3.3mg | 1mL | 1 | A | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| ★day2-day3にデキサメタゾン8mgを服用 | | | | |
| カペシタビン：day1夕食後～day15朝食後 | | | | |
| | | | | |
| Rp.7 | | | | 120minでdiv |
| *オキサリプラチン点滴静注液100mg | 20mL | | mg | |
| *オキサリプラチン点滴静注液50mg | 10mL | | mg | |
| | 130mg/㎡ | | | |
| 5%ブドウ糖250mL | 250mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.8 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | 15minでdiv |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |