

レジメンNo	外科CC12	システム登録No	24012
レジメン名	CAPOX+Bmab	診療科	外科
薬品名 一般名 対象疾患	ベバシズマブBS+カペシタピン+オキサリプラチン ベバシズマブ+カペシタピン+オキサリプラチン 切除不能結腸・直腸癌		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2021.1.25  
2023.2.7

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
投与スケジュール			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	休	休	休	休	休	休	
オキサリプラチン	L-OHP	130mg/m <sup>2</sup>	★																					
カペシタビン	Cape	2000mg/m <sup>2</sup> /日	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
ベバシズマブBS	Bmab	7.5mg/kg	★																					
カペシタビンはday1の夕食後からday15の朝食後まで服用																								

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
day2,day3にデキサメタゾン8mgを内服 カペシタビン: day1夕食後～day15朝食後				
Rp.3	初回は90minでdiv、2回目60minでdiv 3回目以降は30minでdiv可			
混注指示必須				
ベバシズマブBS点滴静注400mg	16mL		mg	
ベバシズマブBS点滴静注100mg	4mL		mg	
	7.5mg/kg			
生理食塩液100mL		1	B	
Rp.4				120minでdiv
*オキサリプラチン点滴静注100mg	20mL		mg	
*オキサリプラチン点滴静注50mg	10mL		mg	
	130mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp5				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	15minでdiv

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間