

レジメンNo	外科CC2	システム登録No	24002
レジメン名	mFOLFOX6+Bmab	診療科	外科
薬品名 一般名 対象疾患	ベバシズマブ+オキサリプラチン+レボホリナート+フルオロウラシル ベバシズマブ+オキサリプラチン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル 切除不能結腸・直腸がん		

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2021.1.25
2023.2.7

day		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール		●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ベバシズマブBS	Bmab	5mg/kg	★												
オキサリプラチン	L-OHP	85mg/m ²	★												
レボホリナート	I-LV	200mg/m ²	★												
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m ²	★												
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m ²	46時間												

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2	初回は90minでdiv、2回目60minでdiv 3回目以降は30minでdiv可			
混注指示必須				
ベバシズマブBS点滴静注400mg	16mL		mg	
ベバシズマブBS点滴静注100mg	4mL		mg	
	5mg/kg			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4 (Rp.5の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m ²			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				120minでdiv
*オキサリプラチン点滴静注100mg	20mL		mg	
*オキサリプラチン点滴静注50mg	10mL		mg	
	85mg/m ²			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
レボホリナートと同時に投与開始				
Rp.6				全開でdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg/m ²			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
レボホリナート終了後				
Rp.7				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400mg/m ²			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				30minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
フルオロウラシル終了後				