

レジメンNo	外科CC5	システム登録No	24005
レジメン名	<b>FOLFIRI+Bmab</b>	診療科	外科
薬品名 一般名 対象疾患	<b>ペバシズマブBS+イリノテカン+レボホリナート+フルオロウラシル</b> ペバシズマブ+イリノテカン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル 切除不能結腸・直腸がん		

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2021.1.25  
2021.1.25

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
投与スケジュール			●	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ペバシズマブBS	Bmab	5mg/kg	★													
イリノテカン	CPT-11	150mg/m <sup>2</sup>	★													
レボホリナート	I-LV	200mg/m <sup>2</sup>	★													
フルオロウラシル	5-FU	400mg/m <sup>2</sup>	★													
フルオロウラシル	5-FU	2400mg/m <sup>2</sup>	46時間													

### 1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
血管確保用				
Rp.2	初回は90minでdiv、2回目60minでdiv 3回目以降は30minでdiv可			
混注指示必須				
ペバシズマブBS点滴静注400mg	16mL		mg	
ペバシズマブBS点滴静注100mg	4mL		mg	
	5mg/kg			
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				15minでdiv
アロキシ静注0.75mg	5mL	1	V	
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
デキサート注射液3.3mg	1mL	1	A	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.4(Rp5の側管)				120minでdiv
レボホリナート点滴静注用100mg			mg	
レボホリナート点滴静注用25mg			mg	
	200mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖液250mL	250mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.5				90minでdiv
イリノテカン点滴静注100mg	5mL		mg	
イリノテカン点滴静注40mg	2mL		mg	
	150mg/m <sup>2</sup>			
5%ブドウ糖250mL	250mL	1	B	
レボホリナートと同時に投与開始				
Rp.6				30minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
イリノテカン終了後				
Rp.7				全開でdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	400mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
レボホリナート終了後				
Rp.8				46hでdiv
フルオロウラシル注1000mg	20mL		mg	
フルオロウラシル注250mg	5mL		mg	
	2400mg/m <sup>2</sup>			
生理食塩液500mL	500mL	1	B	

### 2日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

### 3日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				15minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	1	V	
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
Rp.2				30minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
フルオロウラシル終了後				