

| | | | |
|--------------------|---|----------|-------|
| レジメンNo | 外科CC8 | システム登録No | 24008 |
| レジメン名 | FOLFIRI+Pmab | 診療科 | 外科 |
| 薬品名 一般名 対象疾患 | ベクティビックス+イリノテカン+レボホリナート+フルオロウラシル パニツムマブ+イリノテカン+レボホリナートカルシウム+フルオロウラシル 切除不能結腸・直腸がん | | |

ページNo
作成日
最終更新日

1/2
2021.1.25
2021.1.25

| day | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|----------|--------|-----------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|---|
| 投与スケジュール | | | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ベクティビックス | Pmab | 6 mg/kg | ★ | | | | | | | | | | | | | | |
| イリノテカン | CPT-11 | 150mg/m ² | ★ | | | | | | | | | | | | | | |
| レボホリナート | I-LV | 200mg/m ² | ★ | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル | 5-FU | 400mg/m ² | ★ | | | | | | | | | | | | | | |
| フルオロウラシル | 5-FU | 2400mg/m ² | 46時間 | | | | | | | | | | | | | | |

1日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|-----------------------|--------|----|----|-----------|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| Rp.2 | | | | 15minでdiv |
| アロキシ静注0.75mg | 5mL | 1 | V | |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| デキサート注射液3.3mg | 1mL | 1 | A | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| Rp.3 | | | | 5minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| Rp.4 | | | | 60minでdiv |
| 混注指示必須 | | | | |
| ●ベクティビックス点滴静注400mg | 20ml | | mg | |
| ●ベクティビックス点滴静注100mg | 5ml | | mg | |
| | 6mg/kg | | | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | | mL | |
| 全量100mLになるように生理食塩液で希釈 | | | | |
| Rp.5 | | | | 5minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|-------------------|----------------------|----|----|------------|
| Rp.6(Rp.7の側管) | | | | 120minでdiv |
| レボホリナート点滴静注用100mg | | | mg | |
| レボホリナート点滴静注用25mg | | | mg | |
| | 200mg/m ² | | | |
| 5%ブドウ糖液250mL | 250mL | 1 | B | |
| Rp.7 | | | | 90minでdiv |
| イリノテカン点滴静注液100mg | 5mL | | mg | |
| イリノテカン点滴静注液40mg | 2mL | | mg | |
| | 150mg/m ² | | | |
| 5%ブドウ糖250mL | 250mL | 1 | B | |
| レボホリナートと同時に投与開始 | | | | |
| Rp.8 | | | | 30minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| イリノテカン終了後 | | | | |
| Rp.9 | | | | 全開でdiv |
| フルオロウラシル注1000mg | 20mL | | mg | |
| フルオロウラシル注250mg | 5mL | | mg | |
| | 400mg/m ² | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| レボホリナート終了後 | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|-----------------|-----------------------|----|----|---------|
| Rp.10 | | | | 46hでdiv |
| フルオロウラシル注1000mg | 20mL | | mg | |
| フルオロウラシル注250mg | 5mL | | mg | |
| | 2400mg/m ² | | | |
| 生理食塩液500mL | 500mL | 1 | B | |

2日目

| | | | | |
|---------------|------|---|---|-----------|
| Rp.1 | | | | 15minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |

3日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---------------|-------|----|----|-----------|
| Rp.1 | | | | 15minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 1 | V | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| Rp.2 | | | | 30minでdiv |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| フルオロウラシル終了後 | | | | |