

|        |                        |          |       |
|--------|------------------------|----------|-------|
| レジメンNo | 消化器EC5                 | システム登録No | 25005 |
| レジメン名  | DCF(導入化学療法)            | 診療科      | 外科    |
| 薬品名    | ドセタキセル+シスプラチン+フルオロウラシル |          |       |
| 一般名    | ドセタキセル+シスプラチン+フルオロウラシル |          |       |
| 対象疾患   | 食道癌                    |          |       |

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/2  
2021.8.16  
2023.2.7

|          |      |                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day      |      |                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 投与スケジュール |      |                      | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  |
| ドセタキセル   | DTX  | 70mg/m <sup>2</sup>  | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| シスプラチン   | CDDP | 70mg/m <sup>2</sup>  | ★ |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| フルオロウラシル | 5-FU | 750mg/m <sup>2</sup> | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

### 1日目

| 薬剤名・用法                   | 規格・容量  | 数量 | 単位 | 投与時間       |
|--------------------------|--------|----|----|------------|
| Rp.1(メイン)①               |        |    |    |            |
| 生理食塩液100mL               | 100mL  | 1  | B  |            |
| 血管確保用                    |        |    |    |            |
| Rp.2(メイン)②               |        |    |    | 120minでdiv |
| 硫酸Mg補正液                  | 20mL   | 8  | mL |            |
| テルモ生食 1L                 | 1000mL | 1  | B  |            |
| ★投与開始から3日間1日1L以上の飲水摂取を考慮 |        |    |    |            |
| Rp.3(メイン)③               |        |    |    | 10minでdiv  |
| 生理食塩液 50mL               | 50mL   | 1  | B  |            |
| Rp.4(メイン)④               |        |    |    | 30minでdiv  |
| プロイメンド点滴静注用150mg         |        | 1  | V  |            |
| 生理食塩液 100mL              | 100mL  | 1  | B  |            |
| Rp.5(メイン)⑤               |        |    |    | 30minでdiv  |
| アロキシ静注0.75mg             | 5mL    | 1  | V  |            |
| デキサート注射液6.6mg            | 2mL    | 1  | V  |            |
| デキサート注射液3.3mg            | 1mL    | 1  | A  |            |
| 生理食塩液50mL                | 50mL   | 1  | B  |            |

| 薬剤名・用法           | 規格・容量                | 数量 | 単位 | 投与時間       |
|------------------|----------------------|----|----|------------|
| Rp.6(メイン)⑥       |                      |    |    | 60minでdiv  |
| 混注指示必須           |                      |    |    |            |
| *ドセタキセル点滴静注液80mg | 4mL                  |    | mg |            |
| *ドセタキセル点滴静注液20mg | 1mL                  |    | mg |            |
|                  | 70mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液 250mL      | 250mL                | 1  | B  |            |
| Rp.7(メイン)⑦       |                      |    |    | 24hでdiv    |
| フルオロウラシル注1000mg  | 20mL                 |    | mg |            |
| フルオロウラシル注250mg   | 5mL                  |    | mg |            |
|                  | 750mg/m <sup>2</sup> |    |    |            |
| テルモ生食 1L         | 1000mL               | 1  | B  |            |
| Rp.8(側管)①        |                      |    |    |            |
| 生理食塩液 50mL       | 50mL                 | 1  | B  |            |
| 側管のルート確保用        |                      |    |    |            |
| Rp.9(側管)②        |                      |    |    | 120minでdiv |
| *シスプラチン注50mg     | 100mL                |    | mg |            |
| *シスプラチン注10mg     | 20mL                 |    | mg |            |
|                  | 70mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液500mL       | 500mL                | 1  | B  |            |
| フルオロウラシルと同時に投与開始 |                      |    |    |            |

| 薬剤名・用法                  | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|-------------------------|-------|----|----|-----------|
| Rp.10(側管)③              |       |    |    | 60minでdiv |
| ソリアセトF輸液 500mL          | 500mL | 1  | B  |           |
| Rp.11(側管)④              |       |    |    | 60minでdiv |
| ソリアセトF輸液 500mL          | 500mL | 1  | B  |           |
| Rp.12(側管-2)             |       |    |    | iv        |
| フロセミド注20mg              | 2mL   | 1  | A  |           |
| Rp.10開始と同時に側管-2からワンショット |       |    |    |           |

### 2-5日目

| 薬剤名・用法          | 規格・容量                | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|-----------------|----------------------|----|----|-----------|
| Rp.1(メイン)①      |                      |    |    | 24hでdiv   |
| 混注指示必須          |                      |    |    |           |
| フルオロウラシル注1000mg | 20mL                 |    | mg |           |
| フルオロウラシル注250mg  | 5mL                  |    | mg |           |
|                 | 750mg/m <sup>2</sup> |    |    |           |
| テルモ生食 1L        | 1000mL               | 1  | B  |           |
| Rp.2(側管)①       |                      |    |    | 15minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg   | 2mL                  | 1  | V  |           |
| 生理食塩液50mL       | 50mL                 | 1  | B  |           |