

|        |                  |          |       |
|--------|------------------|----------|-------|
| レジメンNo | 整形BS2            | システム登録No | 81001 |
| レジメン名  | AI               | 診療科      | 整形外科  |
| 薬品名    | ドキシソルピシン+イホマイド   |          |       |
| 一般名    | ドキシソルピシン+イホスファミド |          |       |
| 対象疾患   | 悪性軟部腫瘍           |          |       |

ページNo  
作成日  
最終更新日

1/3  
2020.11.16  
2020.11.16

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 投与スケジュール | ● | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  |
| ドキシソルピシン | ★ | ★ |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| イホマイド    | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

1日目

| 薬剤名・用法              | 規格・容量               | 数量 | 単位 | 投与時間       |
|---------------------|---------------------|----|----|------------|
| Rp.1(メイン)①          |                     |    |    | 12hでivh    |
| メイロン静注7% 20mL       | 20mL                | 2  | A  | 0:00       |
| 生理食塩液1000mL         | 1000mL              | 1  | B  |            |
| Rp.2(メイン)②          |                     |    |    | 12hでivh    |
| メイロン静注7% 20mL       | 20mL                | 3  | A  | 12:00      |
| 生理食塩液1500mL         | 1500mL              | 1  | B  |            |
| Rp.3(側管)①           |                     |    |    | 30minでivh  |
| プロイメド点滴静注用150mg     |                     | 1  | V  | 9:00       |
| 生理食塩液100mL          | 100mL               | 1  | B  |            |
| Rp.4(側管)②           |                     |    |    | 30minでivh  |
| グラニセトロン静注液3mg「明治」   | 3mL                 | 1  | A  | 9:30       |
| デキサート注射液6.6mg       | 2mL                 | 1  | V  |            |
| デキサート注射液3.3mg       | 1mL                 | 1  | A  |            |
| 生理食塩液100mL          | 100mL               | 1  | B  |            |
| Rp.5(側管)③           |                     |    |    | 120minでivh |
| *ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg | 25mL                |    | mg | 10:00      |
| *ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg | 5mL                 |    | mg |            |
|                     | 30mg/m <sup>2</sup> |    |    |            |
| 生理食塩液100mL          | 100mL               | 1  | B  |            |

2日目

| 薬剤名・用法        | 規格・容量                 | 数量 | 単位 | 投与時間       |
|---------------|-----------------------|----|----|------------|
| Rp.6(側管)④     |                       |    |    | 30minでivh  |
| ウロミテキサン注400mg |                       |    | mg | 12:00      |
| ウロミテキサン注100mg |                       |    | mg |            |
|               | 600mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液100mL    | 100mL                 | 1  | B  |            |
| Rp.7(側管-2)⑤   |                       |    |    | 240minでivh |
| 注射用イホマイド1g    |                       |    | mg | 12:30      |
|               | 2000mg/m <sup>2</sup> |    | mg |            |
| 生理食塩液500mL    | 500mL                 | 1  | B  |            |
| 閉鎖式器具を使用して投与  |                       |    |    |            |
| Rp.8(側管)⑥     |                       |    |    | 30minでivh  |
| ウロミテキサン注400mg |                       |    | mg | 16:30      |
| ウロミテキサン注100mg |                       |    | mg |            |
|               | 600mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液100mL    | 100mL                 | 1  | B  |            |
| Rp.9(側管)⑦     |                       |    |    | 30minでivh  |
| ウロミテキサン注400mg |                       |    | mg | 20:30      |
| ウロミテキサン注100mg |                       |    | mg |            |
|               | 600mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液100mL    | 100mL                 | 1  | B  |            |

| 薬剤名・用法              | 規格・容量                | 数量 | 単位 | 投与時間       |
|---------------------|----------------------|----|----|------------|
| Rp.1(メイン)①          |                      |    |    | 12hでivh    |
| メイロン静注7% 20mL       | 20mL                 | 2  | A  | 0:00       |
| 生理食塩液1000mL         | 1000mL               | 1  | B  |            |
| Rp.2(メイン)②          |                      |    |    | 12hでivh    |
| メイロン静注7% 20mL       | 20mL                 | 3  | A  | 12:00      |
| 生理食塩液1500mL         | 1500mL               | 1  | B  |            |
| Rp.3(側管)①           |                      |    |    | 30minでivh  |
| グラニセトロン静注液3mg「明治」   | 3mL                  | 1  | A  | 9:00       |
| デキサート注射液6.6mg       | 2mL                  | 1  | V  |            |
| デキサート注射液3.3mg       | 1mL                  | 1  | A  |            |
| 生理食塩液100mL          | 100mL                | 1  | B  |            |
| Rp.4(側管)②           |                      |    |    | 120minでivh |
| *ドキシソルピシン塩酸塩注射液50mg | 25mL                 |    | mg | 9:30       |
| *ドキシソルピシン塩酸塩注射液10mg | 5mL                  |    | mg |            |
|                     | 30mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液100mL          | 100mL                | 1  | B  |            |
| Rp.5(側管)③           |                      |    |    | 30minでivh  |
| ウロミテキサン注400mg       |                      |    | mg | 11:30      |
| ウロミテキサン注100mg       |                      |    | mg |            |
|                     | 600mg/m <sup>2</sup> |    |    |            |
| 生理食塩液100mL          | 100mL                | 1  | B  |            |

|                    |  |          |       |
|--------------------|--|----------|-------|
| レジメンNo             | 整形BS2                                      | システム登録No | 81001 |
| レジメン名              | AI   | 診療科      | 整形外科  |
| 薬品名<br>一般名<br>対象疾患 | ドキソルピシン+イホマイド<br>ドキソルピシン+イホスファミド<br>悪性軟部腫瘍 |          |       |

ページNo  
作成日  
最終更新日

2/3  
2020.11.16  
2020.11.16

|          |   |   |                     |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----------|---|---|---------------------|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| day      | 1 | 2 | 3                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 投与スケジュール | ● | ● | ●                   | ● | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  |
| ドキソルピシン  |   |   | 30mg/m <sup>2</sup> | ★ | ★ |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| イホマイド    |   |   | 2g/m <sup>2</sup>   | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

3日目、4日目、5日目

| 薬剤名・用法        | 規格・容量                 | 数量 | 単位 | 投与時間       |
|---------------|-----------------------|----|----|------------|
| Rp.6(側管-2)④   |                       |    |    | 240minでivh |
| 注射用イホマイド1g    |                       |    | mg | 12:00      |
|               | 2000mg/m <sup>2</sup> |    | mg |            |
| 生理食塩液500mL    | 500mL                 | 1  | B  |            |
| 閉鎖式器具を使用して投与  |                       |    |    |            |
| Rp.7(側管)⑤     |                       |    |    | 30minでivh  |
| ウロミテキサン注400mg |                       |    | mg | 16:00      |
| ウロミテキサン注100mg |                       |    | mg |            |
|               | 600mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液100mL    | 100mL                 | 1  | B  |            |
| Rp.8(側管)⑥     |                       |    |    | 30minでivh  |
| ウロミテキサン注400mg |                       |    | mg | 20:00      |
| ウロミテキサン注100mg |                       |    | mg |            |
|               | 600mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液100mL    | 100mL                 | 1  | B  |            |

| 薬剤名・用法             | 規格・容量                 | 数量 | 単位 | 投与時間       |
|--------------------|-----------------------|----|----|------------|
| Rp.1(メイン)①         |                       |    |    | 12hでivh    |
| メイロン静注7% 20mL      | 20mL                  | 2  | A  | 0:00       |
| 生理食塩液1000mL        | 1000mL                | 1  | B  |            |
| Rp.2(メイン)②         |                       |    |    | 12hでivh    |
| メイロン静注7% 20mL      | 20mL                  | 3  | A  | 12:00      |
| 生理食塩液1500mL        | 1500mL                | 1  | B  |            |
| Rp.3(側管)①          |                       |    |    | 30minでivh  |
| グラニセトロン 静注液3mg「明治」 | 3mL                   | 1  | A  | 9:00       |
| デキサート注射液6.6mg      | 2mL                   | 1  | V  |            |
| デキサート注射液3.3mg      | 1mL                   | 1  | A  |            |
| 生理食塩液100mL         | 100mL                 | 1  | B  |            |
| Rp.4(側管)②          |                       |    |    | 30minでivh  |
| ウロミテキサン注400mg      |                       |    | mg | 9:30       |
| ウロミテキサン注100mg      |                       |    | mg |            |
|                    | 600mg/m <sup>2</sup>  |    |    |            |
| 生理食塩液100mL         | 100mL                 | 1  | B  |            |
| Rp.5(側管-2)③        |                       |    |    | 240minでivh |
| 注射用イホマイド1g         |                       |    | mg | 10:00      |
|                    | 2000mg/m <sup>2</sup> |    | mg |            |
| 生理食塩液500mL         | 500mL                 | 1  | B  |            |
| 閉鎖式器具を使用して投与       |                       |    |    |            |

| 薬剤名・用法        | 規格・容量                | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|---------------|----------------------|----|----|-----------|
| Rp.6(側管)④     |                      |    |    | 30minでivh |
| ウロミテキサン注400mg |                      |    | mg | 14:00     |
| ウロミテキサン注100mg |                      |    | mg |           |
|               | 600mg/m <sup>2</sup> |    |    |           |
| 生理食塩液100mL    | 100mL                | 1  | B  |           |
| Rp.7(側管)⑤     |                      |    |    | 30minでivh |
| ウロミテキサン注400mg |                      |    | mg | 18:00     |
| ウロミテキサン注100mg |                      |    | mg |           |
|               | 600mg/m <sup>2</sup> |    |    |           |
| 生理食塩液100mL    | 100mL                | 1  | B  |           |

6日目

| 薬剤名・用法        | 規格・容量  | 数量 | 単位 | 投与時間    |
|---------------|--------|----|----|---------|
| Rp.1(メイン)①    |        |    |    | 12hでivh |
| メイロン静注7% 20mL | 20mL   | 2  | A  | 0:00    |
| 生理食塩液1000mL   | 1000mL | 1  | B  |         |