

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
| レジメン名 | DVMP(1コース目)                  |  |
| 薬品名   | ダラザレックス+ベルケイド+アルケラン+プレドニン    |  |
| 一般名   | ダラツムマブ+ボルテゾミブ+メルファラン+プレドニゾロン |  |
| 対象疾患  | 多発性骨髄腫                       |  |

作成日  
最終更新日

2020.5.4  
2020.5.4

| day       |     |                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |
|-----------|-----|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 投与スケジュール  |     |                      | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ● | 休 | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  |  |
| ダラザレックス   |     | 16mg/kg              | ★ |   |   |   |   |   |   | ★ |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |  |
| ベルケイド     |     | 1.3mg/m <sup>2</sup> | ★ |   |   | ★ |   |   |   | ★ |   |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    | ★  |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アルケラン（内服） | MEL | 9mg/m <sup>2</sup>   | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| プレドニン（内服） | PSL | 60mg/m <sup>2</sup>  |   | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| デキサート     | DEX | 19.6mg/body          | ★ |   |   |   |   |   |   | ★ |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |  |

#### 1日目

| 薬剤名・用法                                     | 規格・容量                                                 | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----------|
| Rp.1                                       |                                                       |    |    |           |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                                  | 1  | B  |           |
| 血管確保用                                      |                                                       |    |    |           |
| ★ダラザレックス投与1～3時間前にカロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 |                                                       |    |    |           |
| Rp.2                                       |                                                       |    |    | 30minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg                              | 2mL                                                   | 3  | V  |           |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                                 | 1  | B  |           |
| Rp.3                                       |                                                       |    |    | 60minでdiv |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                                 | 1  | B  |           |
| Rp.4                                       | 0-1h:50mL/h,1-2h:100mL/h<br>2-3h:150mL/h,3h以降:200mL/h |    |    |           |
| 混注指示必須                                     |                                                       |    |    |           |
| ●ダラザレックス点滴静注400mg                          | 20mL                                                  |    | mg |           |
| ●ダラザレックス点滴静注100mg                          | 5mL                                                   |    | mg |           |
|                                            | 16mg/kg                                               |    |    |           |
| 生理食塩液1000mL                                | 1000mL                                                |    | mL |           |
| 合計1000mLとなるように生理食塩液で希釈                     |                                                       |    |    |           |
| Rp.5                                       |                                                       |    |    | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                                  | 1  | B  |           |

| 薬剤名・用法                        | 規格・容量                | 数量  | 単位 | 投与時間 |
|-------------------------------|----------------------|-----|----|------|
| Rp.6                          |                      |     |    | sc   |
| ベルケイド注射用3mg                   |                      |     | mg |      |
|                               | 1.3mg/m <sup>2</sup> |     |    |      |
| 生理食塩液20mL                     | 20mL                 | 1.2 | mL |      |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) |                      |     |    |      |

#### 4日目、11日目、25日目、32日目

| 薬剤名・用法                        | 規格・容量                | 数量  | 単位 | 投与時間 |
|-------------------------------|----------------------|-----|----|------|
| Rp.1                          |                      |     |    | sc   |
| 混注指示必須                        |                      |     |    |      |
| ベルケイド注射用3mg                   |                      |     | mg |      |
|                               | 1.3mg/m <sup>2</sup> |     |    |      |
| 生理食塩液20mL                     | 20mL                 | 1.2 | mL |      |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) |                      |     |    |      |

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
| レジメン名 | DVMP(1コース目)                  |  |
| 薬品名   | ダラザレックス+ベルケイド+アルケラン+プレドニン    |  |
| 一般名   | ダラツムマブ+ボルテゾミブ+メルファラン+プレドニゾロン |  |
| 対象疾患  | 多発性骨髄腫                       |  |

作成日 2020.5.4  
最終更新日 2020.5.4

| day       |     |                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|-----------|-----|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 投与スケジュール  |     |                      | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ● | 休 | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  |
| ダラザレックス   |     | 16mg/kg              | ★ |   |   |   |   |   |   | ★ |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |
| ベルケイド     |     | 1.3mg/m <sup>2</sup> | ★ |   |   | ★ |   |   |   | ★ |   |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    | ★  |    |    |    | ★  |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| アルケラン（内服） | MEL | 9mg/m <sup>2</sup>   | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| プレドニン（内服） | PSL | 60mg/m <sup>2</sup>  |   | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| デキサート     | DEX | 19.6mg/body          | ★ |   |   |   |   |   |   | ★ |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |

## 8日目

| 薬剤名・用法                                     | 規格・容量                                                 | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----|----|-----------|
| Rp.1                                       |                                                       |    |    |           |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                                  | 1  | B  |           |
| 血管確保用                                      |                                                       |    |    |           |
| ★ダラザレックス投与1～3時間前にカロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 |                                                       |    |    |           |
| Rp.2                                       |                                                       |    |    | 30minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg                              | 2mL                                                   | 3  | V  |           |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                                 | 1  | B  |           |
| Rp.3                                       |                                                       |    |    | 60minでdiv |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                                 | 1  | B  |           |
| Rp.4                                       | 0-1h:50mL/h,1-2h:100mL/h<br>2-3h:150mL/h,3h以降:200mL/h |    |    |           |
| 混注指示必須                                     |                                                       |    |    |           |
| ●ダラザレックス点滴静注400mg                          | 20mL                                                  |    | mg |           |
| ●ダラザレックス点滴静注100mg                          | 5mL                                                   |    | mg |           |
|                                            | 16mg/kg                                               |    |    |           |
| 生理食塩液500mL                                 | 500mL                                                 |    | mL |           |
| 合計500mLとなるように生理食塩液で希釈                      |                                                       |    |    |           |
| (前回投与時にinfusion reactionが認められなかった場合)       |                                                       |    |    |           |
| Rp.5                                       |                                                       |    |    | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL                                  |                                                       | 1  | B  |           |

| 薬剤名・用法                        | 規格・容量                | 数量  | 単位 | 投与時間 |
|-------------------------------|----------------------|-----|----|------|
| Rp.6                          |                      |     |    | sc   |
| ベルケイド注射用3mg                   |                      |     | mg |      |
|                               | 1.3mg/m <sup>2</sup> |     |    |      |
| 生理食塩液20mL                     | 20mL                 | 1.2 | mL |      |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) |                      |     |    |      |

## 15日目

| 薬剤名・用法                                     | 規格・容量                                     | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|-----------|
| Rp.1                                       |                                           |    |    |           |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                      | 1  | B  |           |
| 血管確保用                                      |                                           |    |    |           |
| ★ダラザレックス投与1～3時間前にカロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 |                                           |    |    |           |
| Rp.2                                       |                                           |    |    | 30minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg                              | 2mL                                       | 3  | V  |           |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                     | 1  | B  |           |
| Rp.3                                       |                                           |    |    | 60minでdiv |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                     | 1  | B  |           |
| Rp.4                                       | 0-1h:100mL/h,1-2h:150mL/h<br>2h以降:200mL/h |    |    |           |
| 混注指示必須                                     |                                           |    |    |           |
| ●ダラザレックス点滴静注400mg                          | 20mL                                      |    | mg |           |
| ●ダラザレックス点滴静注100mg                          | 5mL                                       |    | mg |           |
|                                            | 16mg/kg                                   |    |    |           |
| 生理食塩液500mL                                 | 500mL                                     |    | mL |           |
| 合計500mLとなるように生理食塩液で希釈                      |                                           |    |    |           |
| (前回投与時にinfusion reactionが認められなかった場合)       |                                           |    |    |           |
| Rp.5                                       |                                           |    |    | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                      | 1  | B  |           |

|       |                              |  |
|-------|------------------------------|--|
| レジメン名 | DVMP(1コース目)                  |  |
| 薬品名   | ダラザレックス+ベルケイド+アルケラン+プレドニン    |  |
| 一般名   | ダラツムマブ+ボルテゾミブ+メルファラン+プレドニゾロン |  |
| 対象疾患  | 多発性骨髄腫                       |  |

作成日  
最終更新日

2020.5.4  
2020.5.4

| day       |     |                      | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |  |
|-----------|-----|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 投与スケジュール  |     |                      | ● | ● | ● | ● | 休 | 休 | 休 | ● | 休 | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | ●  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  | 休  |  |
| ダラザレックス   |     | 16mg/kg              | ★ |   |   |   |   |   |   | ★ |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |  |
| ベルケイド     |     | 1.3mg/m <sup>2</sup> | ★ |   |   | ★ |   |   |   | ★ |   |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    | ★  |    |    |    | ★  |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| アルケラン（内服） | MEL | 9mg/m <sup>2</sup>   | ★ | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| プレドニン（内服） | PSL | 60mg/m <sup>2</sup>  |   | ★ | ★ | ★ |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| デキサート     | DEX | 19.6mg/body          | ★ |   |   |   |   |   |   | ★ |   |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    | ★  |    |    |    |    |    |    |  |

## 22日目,29日目

| 薬剤名・用法                                     | 規格・容量                                     | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|-----------|
| Rp.1                                       |                                           |    |    |           |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                      | 1  | B  |           |
| 血管確保用                                      |                                           |    |    |           |
| ★ダラザレックス投与1～3時間前にカロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 |                                           |    |    |           |
| Rp.2                                       |                                           |    |    | 30minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg                              | 2mL                                       | 3  | V  |           |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                     | 1  | B  |           |
| Rp.3                                       |                                           |    |    | 60minでdiv |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                     | 1  | B  |           |
| Rp.4                                       | 0-1h:100mL/h,1-2h:150mL/h<br>2h以降:200mL/h |    |    |           |
| 混注指示必須                                     |                                           |    |    |           |
| ●ダラザレックス点滴静注400mg                          | 20mL                                      |    | mg |           |
| ●ダラザレックス点滴静注100mg                          | 5mL                                       |    | mg |           |
|                                            | 16mg/kg                                   |    |    |           |
| 生理食塩液500mL                                 | 500mL                                     |    | mL |           |
| 合計500mLとなるように生理食塩液で希釈                      |                                           |    |    |           |
| Rp.5                                       |                                           |    |    | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                      | 1  | B  |           |

## 22日目,29日目

| 薬剤名・用法                        | 規格・容量                | 数量  | 単位 | 投与時間 |
|-------------------------------|----------------------|-----|----|------|
| Rp.6                          |                      |     |    | sc   |
| ベルケイド注射用3mg                   |                      |     | mg |      |
|                               | 1.3mg/m <sup>2</sup> |     |    |      |
| 生理食塩液20mL                     | 20mL                 | 1.2 | mL |      |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) |                      |     |    |      |

## 36日目

| 薬剤名・用法                                     | 規格・容量                                     | 数量 | 単位 | 投与時間      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|----|----|-----------|
| Rp.1                                       |                                           |    |    |           |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                      | 1  | B  |           |
| 血管確保用                                      |                                           |    |    |           |
| ★ダラザレックス投与1～3時間前にカロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 |                                           |    |    |           |
| Rp.2                                       |                                           |    |    | 30minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg                              | 2mL                                       | 3  | V  |           |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                     | 1  | B  |           |
| Rp.3                                       |                                           |    |    | 60minでdiv |
| 生理食塩液100mL                                 | 100mL                                     | 1  | B  |           |
| Rp.4                                       | 0-1h:100mL/h,1-2h:150mL/h<br>2h以降:200mL/h |    |    |           |
| 混注指示必須                                     |                                           |    |    |           |
| ●ダラザレックス点滴静注400mg                          | 20mL                                      |    | mg |           |
| ●ダラザレックス点滴静注100mg                          | 5mL                                       |    | mg |           |
|                                            | 16mg/kg                                   |    |    |           |
| 生理食塩液500mL                                 | 500mL                                     |    | mL |           |
| 合計500mLとなるように生理食塩液で希釈                      |                                           |    |    |           |
| Rp.5                                       |                                           |    |    | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL                                  | 50mL                                      | 1  | B  |           |