レジメン名	DVd(1コース目)
薬品名	ダラザレックス+ベルケイド+レナデックス(デキサート)
一般名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン
対象疾患	多発性骨髄腫

作成日 2020.7.24
最終更新日 2020.7.24

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	休	●	●	休	休	●	●	休	●	●	休	休	●	休	休	休	休	休	休
ダラザレックス		16mg/kg	★							★							★						
ベルケイド		1.3mg/㎡	★			★				★			★										
デキサート	DEX	19.6mg/body	★							★							(★)						
レナデックス(内服)	DEX	20mg/body		★		★	★				★		★	★									
(※75歳以上はデキサメタゾン20mg/weekも可)																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				
生理食塩液50mL	50mL	1	B	
血管確保用				
★ダラザレックス投与1～3時間前にカロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
Rp.2				30minでdiv
デキサート注射液6.6mg	2mL	3	V	
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.3				60minでdiv
生理食塩液100mL	100mL	1	B	
Rp.4	0-1h:50mL/h,1-2h:100mL/h			
混注指示必須	2-3h:150mL/h,3h以降:200mL/h			
●ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ点滴静注400mg	20mL		mg	
●ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ点滴静注100mg	5mL		mg	
	16mg/kg			
生理食塩液1000mL	1000mL		mL	
合計1000mLとなるように生理食塩液で希釈				
Rp.5				15minでdiv
生理食塩液50mL	50mL	1	B	

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.6				sc
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

4日目、11日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				