| レジメン名 | DVd(2-3コース目) |
|---|---|
| 薬品名 | ダラザレックス+ベルケイド+レナデックス(デキサート) |
| 一般名 | ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン |
| 対象疾患 | 多発性骨髄腫 |

作成日 2020.7.24
最終更新日 2020.7.24

| day | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投与スケジュール | | | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ダラザレックス | | 16mg/kg | ★ | | | | | | | ★ | | | | | | | ★ | | | | | | |
| ベルケイド | | 1.3mg/㎡ | ★ | | | ★ | | | | ★ | | | ★ | | | | | | | | | | |
| デキサート | DEX | 19.6mg/body | ★ | | | | | | | ★ | | | | | | | (★) | | | | | | |
| レナデックス(内服) | DEX | 20mg/body | | ★ | | ★ | ★ | | | | ★ | | ★ | ★ | | | | | | | | | |
| (※75歳以上はデキサメタゾン20mg/weekも可) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 1日目、8日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| 血管確保用 | | | | |
| ★ダラザレックス投与1～3時間前にカロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 | | | | |
| | | | | |
| Rp.2 | | | | 30minでdiv |
| デキサート注射液6.6mg | 2mL | 3 | V | |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.3 | | | | 60minでdiv |
| 生理食塩液100mL | 100mL | 1 | B | |
| | | | | |
| Rp.4 | 0-1h:100mL/h,1-2h:150mL/h<br>2h以降:200mL/h | | | |
| 混注指示必須 | | | | |
| ●ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ点滴静注400mg | 20mL | | mg | |
| ●ﾀﾞﾗｻﾞﾚｯｸｽ点滴静注100mg | 5mL | | mg | |
| | 16mg/kg | | | |
| 生理食塩液500mL | 500mL | | mL | |
| 合計500mLとなるように生理食塩液液で希釈 | | | | |
| | | | | |
| Rp.5 | | | | 15minでdiv |
| 生理食塩液50mL | 50mL | 1 | B | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.6 | | | | sc |
| ベルケイド注射用3mg | | | mg | |
| | 1.3mg/㎡ | | | |
| 生理食塩液20mL | 20mL | 1.2 | mL | |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 4日目、11日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | sc |
| 混注指示必須 | | | | |
| ベルケイド注射用3mg | | | mg | |
| | 1.3mg/㎡ | | | |
| 生理食塩液20mL | 20mL | 1.2 | mL | |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |