| レジメン名 | [皮下]DVd(1-3コース目) |
|---|---|
| 薬品名 | ダラキューロ+ベルケイド+レナデックス |
| 一般名 | ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン |
| 対象疾患 | 多発性骨髄腫 |

作成日 2021.6.21
最終更新日 2021.6.21

| day | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投与スケジュール | | | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 | ● | ● | 休 | ● | ● | 休 | 休 | ● | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| ダラキューロ | | 1800mg/body | ★ | | | | | | | ★ | | | | | | | ★ | | | | | | |
| ベルケイド | | 1.3mg/㎡ | ★ | | | ★ | | | | ★ | | | ★ | | | | | | | | | | |
| レナデックス（内服） | DEX | 20mg/body | ★ | ★ | | ★ | ★ | | | ★ | ★ | | ★ | ★ | | | (★) | | | | | | |
| （※75歳以上はデキサメタゾン20mg/weekも可） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1日目、8日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | 3～5分でsc |
| 混注指示必須 | | | | |
| ダラキューロ配合皮下注 | 15mL | 15 | mL | |
| | 1800mg/body | | | |
| ★ダラキューロ投与1～3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 | | | | |
| | | | | |
| Rp.2 | | | | sc |
| ベルケイド注射用3mg | | | mg | |
| | 1.3mg/㎡ | | | |
| 生理食塩液20mL | 20mL | 1.2 | mL | |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) | | | | |

4日目、11日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | sc |
| 混注指示必須 | | | | |
| ベルケイド注射用3mg | | | mg | |
| | 1.3mg/㎡ | | | |
| 生理食塩液20mL | 20mL | 1.2 | mL | |
| 1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL) | | | | |

15日目

| 薬剤名・用法 | 規格・容量 | 数量 | 単位 | 投与時間 |
|---|---|---|---|---|
| Rp.1 | | | | 3～5分でsc |
| 混注指示必須 | | | | |
| ダラキューロ配合皮下注 | 15mL | 15 | mL | |
| | 1800mg/body | | | |
| ★ダラキューロ投与1～3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用 | | | | |