レジメン名	[皮下]DVd(4-8コース目)
薬品名	ダラキューロ+ベルケイド+レナデックス
一般名	ダラツムマブ+ボルテゾミブ+デキサメタゾン
対象疾患	多発性骨髄腫

作成日 2021.6.21
最終更新日 2021.6.21

day			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
投与スケジュール			●	●	休	●	●	休	休	●	●	休	●	●	休	休	休	休	休	休	休	休	休
ダラキューロ		1800mg/body	★																				
ベルケイド		1.3mg/㎡	★			★				★			★										
レナデックス（内服）	DEX	20mg/body	★	★		★	★			★	★		★	★									
（※75歳以上はデキサメタゾン20mg/weekも可）																							

1日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				3～5分でsc
混注指示必須				
ダラキューロ配合皮下注	15mL	15	mL	
	1800mg/body			
★ダラキューロ投与1～3時間前にレナデックス20mg、カロナール1000mg、オロパタジン10mgを服用				
Rp.2				sc
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				

4日目、8日目、11日目

薬剤名・用法	規格・容量	数量	単位	投与時間
Rp.1				sc
混注指示必須				
ベルケイド注射用3mg			mg	
	1.3mg/㎡			
生理食塩液20mL	20mL	1.2	mL	
1Vあたり1.2mLの生理食塩液で溶解(2.5mg/mL)				